

# ИСКУССТВА ПОВИВАНІЯ

ИЛИ

науки о бабичьемъ дѣлѣ

ЧАСТЬ ТРЕТІЯ

СОДЕРЖАЩАЯ

Краткое но ясное описаніе болѣзней, кои беременнымъ женамъ, во время продолженія ихъ беременности, отъ начала зачатія даже до окончанія родовъ приключаются: примѣчанія о шаковыхъ припадкахъ, достоверными опытами подкрѣпляемые: наставленія о томъ, что въ шаковыхъ случаяхъ вѣдать и дѣлать нужно: и врачебныя средства къ облегченію и отвращенію болѣзненныхъ припадковъ способствующія.

Съ рисунками.

Для пользы Россійскихъ лѣкарей и повивальныхъ бабокъ.

сочинена

Несторомъ Максимовичемъ Амбодикомъ

Врачебной науки Докторомъ и Профессоромъ повивальнаго искусства.

---

Во градѣ С. Петра. 1786 года.



Беременность есть естественная женская немочь. Каждая беременная жена должна вслѣдствіе стараться о томъ, дабы ей благополучно разрѣшиться отъ сего бремени ношенія. Когдажъ прежде зачатія, во время беременности, или послѣ родовъ приключатся болѣзненные припадки такой женѣ, которая въ прочемъ есть здоровою, и имѣетъ доброе сложеніе и строеніе тѣла; таковая да вѣдаетъ, что она сама есть того причиною, по собственному о себѣ нерадѣнію и небреженію о своемъ поведеніи.





# ВСТУПЛЕНІЕ

Касательно

## ПРЕДОХРАНЕНІЯ ЗДРАВІЯ И БЛАГО- ПОВЕДЕНІЯ ЖЕНЪ БЕРЕМѢННЫХЪ ВООБЩЕ.

I. Беременная жена, какъ скоро почувствуетъ, что она во своей употребъ зачала, сугубо обязывается всячески наблюдать добропорядочную жизнь, и благоповеденіе во всемъ ея состоянію приличное; ибо она должна прилѣжно пещися не токмо о предохраненіи собственнаго здравія: но еще имѣть попеченіе и о соблюденіи носимаго ею употребнаго плода.

II. Образъ жизни ея долженъ быть учреждаемъ согласно и прилично ея состоянію; а по тому и надлежитъ ей имѣть крайнее вниманіе въ разсужденіи вещей ея окружающихъ, и ею употребляемыхъ; изъ коихъ первѣйшія суть сіи: воздухъ, одѣяніе, пища и питіе, тѣлодвиженіе и покой, сонъ и бдѣніе, душевныя возмущенія, естественныя испражненія, и употребленіе нужныхъ лѣкарствъ.



III. Воздухъ умеренно теплый, чистый, здороавый, благораспворенный и свѣжій для беременнхъ есть всего нужнѣе. Чего ради должно всегда спарашься о томъ, дабы оный въ ихъ горницахъ часто былъ возобновляемъ и поправляемъ, впущеніемъ свѣжаго воздуха, укусуными парами, куришельными порошками, благовонными свѣчами и пр. ибо чрезмѣрно теплый, нечиспый, гилый, сырый, мокрый и вонючій воздухъ беременнымъ весьма вреденъ бываетъ. Не меньше имъ вредить могутъ и скоропостижныя перемены воздушныя, особливо сильный жаръ, жестокая спужа и холодъ. Многія улаждаются обонаніемъ благовонныхъ цвѣшовъ и другихъ веществъ; напрошивъ того многимъ женамъ, какъ скоро онѣ забрюхашѣютъ, все то, что есть проникательное, лепучее, душистое и ароматическое, бываетъ весьма прошивно и непріятно; а нѣкоторыхъ поражаетъ столь сильно, что онѣ отъ того въ жестокіе омраки и слабостъ впадають.

IV. Одѣяніе беременнхъ женъ должно быть ни чрезмѣрно легкое, ни весьма тяжелое: но умеренно теплое, способное, благоприспое, и годичному времени приличествующее. Узкія и тѣсныя шиуровки, изътвердыхъ и упру-  
гихъ



гихъ рыбьихъ костей сдѣланныя, причиняющъ имъ великой вредъ; ибо оными груди опивсюда зжаты и сдавлены будучи, препящивуютъ свободному дыханію, варенію же желудка, и опдѣленію соковъ питательныхъ. Сверхъ того въ сосцахъ дѣлаются зашвердѣлыя опухоли, и сосочки уравниваются и внутрь груди вдавливаются; что послѣ родовъ причиняетъ младенцу не малую трудность въ сосаніи млека. Множество носимыхъ юпокъ, и шуго вокругъ шѣла опоясанныхъ, не меньше вредитъ беременнымъ; ибо отъ того у нихъ животъ и всѣ внутренности стѣсняются, приключается невареніе желудка, и младенецъ не можетъ имѣть свободного своимъ членамъ разположенія. Найпаче для беременныхъ есть вредно и опасно то, когда онѣ принужденно, слѣдуя глупой модѣ, носятъ узкіе и стѣсные башмаки съ тонкими и возвышенными каблуками. Таковая обувь легко можетъ причинить преткновеніе; а каждый внезапный скачокъ, и шагъ паденіе причиняющій, почти всегда есть виною худыхъ и опасныхъ слѣдствій, особливо для беременныхъ. Мнимая красота груди и ногъ, о коей столько пекутся, часто исчезаетъ, единственно чрезъ сіе одно, когда беремен-



ныя, помышляя только о соблюденіи стройности своего щѣла, заблаговременно не радятъ объ отвращеніи прочихъ, отпшуда произходящихъ, невыгодъ.

V. Пища для беременныхъ женъ должна быть легкая, желудка не опягощающая, скоро въ немъ сваривающаяся, и пищательная. Если беременная не имѣетъ испорченнаго вкуса, ни поскливости, ни отвращенія къ извѣстнымъ вещамъ: то можно ей, слѣдуя внутреннему своему побужденію, питаться говядиною, шеляпиною, бараниною, цыплятами, рябчиками, събѣлымъ пшеничнымъ хлѣбомъ, квашенымъ и хорошо упеченымъ; можно ей употреблять свѣжіе коровьи сливки, яйца, свѣжую не жирную рѣчную и морскую рыбу. Не вредны беременнымъ и поваренныя зелія, какъ то салатъ, ендивія, цихорей, шпинатъ и пр. разнымъ образомъ приправленные. Небезполезны и лѣпніе овощи, напр. зрѣлыя яблоки, вишни, сливы, абрикосы, шапшала, померанцы и фиги. Напротивъ того вредны для нихъ почищающіяся мяса и рыбы жирныя, соленыя, копченныя: всякія пряныя, кислыя, трудно сваривающіяся вещества: всякіе кислые и созрѣлые плоды, особливо груши и сахарные заѣдки; выключая постелу яблочную,

кля-



клюковную, брусничную и проч. коими вареніе пици поспѣшествуется.

VI. Питье для беременнѣхъ да будетъ чистая, свѣжая, легкая, ключевая, рѣчная или колодезная вода, съ хорошимъ старымъ винограднымъ виномъ смѣшиваемая, также хорошее полпиво, медъ и мясные кислыши. Послѣ кушанья не бесполезно выпить рюмку винограднаго спараго, напр. ренскаго, бургонскаго, аликантскаго, или другаго добраго вина. Рапафію, наливки и ликеры, особливо слабосильнымъ и неваренію подверженнымъ, равно какъ и кофе, привыкшимъ къ сему питью, не запрещаются. Вообще беременныя должны всячески воздерживаться отъ разгорячительныхъ, холодныхъ, и со льдомъ наспоянныхъ напитковъ, и отъ частаго употребленія мороженныхъ сластей.

VII. Тѣлодвиженіе легкое, умѣренное есть для беременнѣхъ столькожъ нужно, сколько и питаніе. Правильно съ самого начала беременности совѣтуютъ имъ чрезъ нѣсколько дней сряду не вставать съ постели, и воздержаться отъ всего того, что горячитъ и приводитъ кровь въ волнованіе. Прогулка предпріемлемая въ жестокіе лѣтніе жары, или во время мрачное, дождливое, А 3 мокрое



мокрое и холодное для нихъ опнудъ негодился, не меньше какъ и верховая ѣзда, также скорое по мостовымъ и камнемъ вымощеннымъ улицамъ, бѣганье въ карепѣ, одноконкѣ и на дрожкахъ. Особливожъ шѣ жены, кои уже прежде были подвержены выкидыванію или недоношенію, повинны спараться о томъ, дабы содержать себя, въ покой: не приподнимають высоко вверхъ ни рукъ ни ногъ: не утирають своими руками голову: не поднимають и на раменахъ не носятъ никакихъ тяжелыхъ шѣлъ, какого бы качества они ни были: убѣгаютъ пляски, танцовъ, скаканья и прыганья: воздерживаются отъ хохотанья и смѣха, отъ крику и вопля, отъ чиханья и проспуды, и отъ частаго плотскаго совокупленія. Частая, легкая и умѣренная пѣшая прогулка по уравненной земли вообще беременнымъ пользуется больше, чѣмъ всякое другое шѣлодвиженіе. При чемъ чувствуюмую отъ ходьбы усталость попеременно награждать можно частымъ сидѣніемъ и опдохновеніемъ.

VIII. Сонъ обыкновенно шѣмъ пріятнѣе бываетъ, чѣмъ большія упражненія и шѣлодвиженіе оному предшесвуютъ. Для беременныхъ лучше ложиться въ постелью ранѣе,  
и вспа-



и вставать пораньше, чѣмъ просиживать до глубокой ночи. Восемь или десять часовъ для сна и успокоенія опѣ дневныхъ трудовъ беременнымъ довлѣютъ. Положеніе тѣла не меньшей естѣь важности, какъ и время для отдохновенія опредѣляемое. Лучше съ вечера сперва ложиться на лѣвой бокъ, а потомъ пробудясь переворачиваться на правой. Однакоже на одномъ боку лежанье бываетъ виною косновеннаго положенія матки и содержимаго въ ней младенца. Долговременное бдѣніе, равномерно какъ и неумѣренный сонъ, и препровожденіе времени въ безпрерывномъ покои, наипаче беременнымъ вредятъ, въ разслабленіе приводятъ все тѣло, а часпо причиняютъ трудные и ненатуральные роды. Для опвращенія сего беременныя должны за-благовременно сами о себѣ пецися, и по встрѣчающимся обстоятельствомъ, касательно собственнаго здравія и расположенія силъ тѣлесныхъ, наблюдать столь нужную для нихъ во снѣ и бдѣіи благоумѣренность.

ІХ. Душевные возмущенія, или пристрастія сильныя вредятъ всякому человѣку, а особливо беременнымъ: и для того онѣ за-благовременно онымъ сопротивляться должны; ибо сколько умѣренное увеселеніе и спокойствіе



віе духа сущь полезны: столько чрезмѣрная радость, не обузданная любовь, глубокая, печаль и сѣтованіе, жестокій гнѣвъ и ярость, внезапный смрахъ, и другія непрерывныя суены, заботы и безпокойствія сущь вредны; поелику ввергають беременныхъ, совокупно съ ихъ упробнымъ плодомъ, въ великую опасность жизни. Любовныя прихоти, во время беременности, отъ нѣкоторыхъ только въ послѣднія мѣсяцы, а отъ другихъ вовсе запрецаются. Большая часть женъ забрюхатѣвъ, ни какъ немогутъ терпѣть мужнихъ обѣщаній. Но естъ и такія, кои по совершившемся уже зачатіи еще съ большимъ жаромъ предаются онымъ. Вообще примѣчено, что беременныя жены больше прихотливы и любопытны бывають въ первыя, чѣмъ въ послѣднія времена беременности. Примѣчено и то, что тѣ, кои чрезъ все продолженіе своего чревоношенія имѣли желаемое во всемъ удовольствіе, имѣють скорые и благополучныя роды. Женамъ, великія прихоти и сильныя побужденія къ законной любви имѣющимъ, никогда не должно ни въ чемъ отказываться. Часто одно только на желаемую вещь взрѣніе, совершенно ихъ довольными и спокойными дѣлаетъ. Тѣмъ, кои въ семъ случаѣ ведаютъ



велятъ брашъ примѣры отъ живописныхъ, единожды брюхатыми содѣлавшихся, и больше онаго не ищущихъ, приличествуемъ здѣсь въ отвѣтъ сказать, что они такое сравненіе дѣлаютъ не къ спашу. Въ прочемъ какъ въ другихъ случаяхъ, такъ и здѣсь не качество и употребленіе, но количество и злоупотребленіе суть виною худыхъ и опасныхъ слѣдствій.

X. Естественныя испраженія должны быть у беременныхъ женъ продолжаемы порядочнымъ образомъ, т. е. ни малы и скудны, ни велики и чрезмѣрны. Задержаніе исхожденія нечувствительныхъ паровъ, запоръ мочи, завалы въ животѣ, напыщеніе, сильный пошъ, мышъ и кровавый поносъ: словомъ, все то, что есть сверхъ естественнымъ и необыкновеннымъ, подвергаетъ беременныхъ многимъ опасностямъ и безпокойствамъ; для отвращенія коихъ служатъ промывательныя, легкія слабительныя, рвотныя лѣкарства, кровопусканіе, и парныя бани умеренно употребляемыя.

XI. Промывательныя лѣкарства весьма пользуютъ беременнымъ, особливо шѣмъ, кои суть подвержены частому запору, ощущаютъ въ себѣ внутренней жаръ, поскли-  
востъ и опрощеніе отъ пищи, и испраж-  
дуютъ



душѣ частною болью, рѣзью и колодьемъ въ животѣ. Для отвращенія таковыхъ припадковъ полезнымъ почищается взваръ изъ овсянной или ячменной или перловой крупы, либо пшеничныхъ опрубовъ прѣугоповленный, или простая рѣчная вода. Когдажъ припадки неумалаяются, въ такомъ случаѣ можно наставить промывательное подѣ No. 1. предписанное. Прежде употребленія слабительнаго лѣкарства, если нужда того потребуетъ, всегда лучше сперва наставить промывательное.

XII. Легкія слабительныя лѣкарства имѣютъ мѣсто тогда, когда беременная изобилуетъ многими мокротами, много плюетъ, и припомъ имѣетъ блѣдное лице: когда прежде зачатія мѣсячное кровотеченіе у ней было въ маломъ количествѣ: когда ей случается частый позывъ на рвошу, либо и самая рвоша, особливо послѣ того, какъ скоро чего нѣстъ покушаетъ: когда она часто поитъ, и испарина есть только частная: на конецъ когда у беременной приключится поносъ, печеніе бѣли, бѣеніе боевыхъ жилъ слабое, мягкое и полное. Въ таковыхъ случаяхъ можно ей дать слабительное подѣ No. 2. Еслижъ оное окажется не довольно дѣйствительнымъ, тогда дать ей другой слабительной



ной составъ, подъ No. 3. предписанной. Вообще каждая беременная должна во всякое время крайне беречься сильныхъ проносныхъ смолистыхъ, острыхъ и раздражающихъ лѣкарствъ. Невзирая на то, что женщины разпусной жизни забрюхашивъ, часто принимаютъ родогонительныя для истребленія зачатого въ ихъ утробѣ зарода; хотя таковыя иногда и сами вмѣстѣ со своимъ плодомъ бѣдственно погибаютъ. Не смотря и на то, что многія брюхашныя женщины внутренно употребляли найсильнѣйшія проносныя лѣкарства: однакожъ и имѣли благополучныя роды, и сами въ живыхъ остались, можетъ быть, къ большому своей безпушной жизни обличенію. Прежде употребленія слабительныхъ, всегда лучше сперва кинуть кровь, если только врачебное показаніе повелѣваетъ,

XIII. Рвотныя легкія, иногда беременнымъ приличествуютъ, только не въ началѣ беременности, особливо, если онѣ сами въ себѣ чувствуютъ частое на рвоту побужденіе; а при томъ если онѣ не весьма сушь многокровны. Таковымъ можно дать предписанное подъ No. 4. рвотное.

XIV. Кровопусканіе пользуется женамъ беременнымъ многокровнымъ, и шѣмъ, кои пре-



прежде беремености были подвержены изобильному кровошеченію мѣсячному: у коихъ бѣненіе въ боевыхъ жилахъ есть полное и твердое: также и шѣмъ, кои питаются худою и нездоровою пищею: кои подвержены кровошеченію изъ носа или изъ машки, судоргамъ, корабъ и рвошъ: кои въ себѣ чувствуютъ слабость, пѣгость, усѣалость, пошноту, и позывъ на рвошу: и на послѣдокъ шѣмъ, коимъ часто приключается главоболѣніе, омраки, безсонница, пѣжелая одышка и проч. Кровь кидашъ имъ изъ руки во 2 мѣ, или 3 мѣсяцѣ, либо по прошествіи 6 недѣль опѣ зачатіи. Худо дѣлающъ шѣ, кои опкладаваютъ кровопусканіе до чѣтырехъ съ половиною мѣсяцей. Въ случаѣ нужды можно и повѣторить кровопусканіе: но безъ врачебнаго показанія никогда не должно кидать кровь. За каждымъ разомъ опѣ 6 до 8 унцовъ крови выпустить. Полнокровнымъ дозволяется кровопусканіе въ 9 мѣсяцѣ, также и въ то время, когда беременная въ первой разъ въ себѣ возчувствуетъ дѣйствіе переймовъ, и передъ родами. Когда беременная боится, или имѣетъ крайнее къ кровопусканію отвращеніе: когда она впадаетъ въ великую слабость и омраки, во то время, какъ ей открываютъ кровеносную жилу:

когда



когда изъ учиненнаго опшверспія кровь едва каплями истекаетъ, по причинѣ малости и тонкости кровеносныхъ сосудовъ; въ такомъ случаѣ лучше опшюдъ таковымъ беременнымъ крови не пускать, но вмѣсто того имѣть прибѣжище ко слабительнымъ лѣкарствамъ. Женщины распутную жизнь ведущія, забрюхатѣвъ, имѣющъ обыкновеніе потчасъ себя пускать кровь изъ ноги, съ тѣмъ намѣреніемъ, дабы испребивъ, не законнымъ образомъ зачатой во чревѣ плодъ, покрытъ тѣмъ и свое безстыдство. Однако многіе примѣры намъ доказываютъ прошивное. Врачъ Морисо, какъ самовидецъ, пишетъ, что во время беременности двумъ женамъ, одной 48, а другой 90 разъ кидали кровь; однакожъ обѣ онѣ отъ того не выкинули, но родили живыхъ дѣтей во свое время благополучно. Врачъ Дела мотпъ самъ пускалъ кровь одной беременной 86 разъ: но она отъ того не выкинула. Врачъ Ле фебюръ кидалъ кровь одной комедіанкѣ даже до крайняго силъ изнеможенія; по помъ она сама многократно принимала сильныя рвошныя и крѣпкія проносныя лѣкарства, кашалась брюхомъ по полу, била себя чрево руками: однокожъ при всемъ помъ не могла видѣть исполненіе злаго своего намѣренія



нія, и въ надлежащее время родила благополучно. Не смотря на все сіе, кровопусканіе изъ ноги, равно какъ и крѣпкія проносныя лѣкарства беременнымъ справедливо отъ врачей запрещаются. И такъ гдѣ тѣ жены, о коихъ говорящъ, будыпо онѣ выкидываютъ отъ сморканья, носа?

XV. На послѣдокъ парныя бани для беременныхъ, вскорѣ послѣ зачатія употребляемая негодятся, развѣ особливая нужда оными воспользоваться воспребуетъ, либо беременная по давней свой привычкѣ безъ нихъ обойтись не можетъ. Въ продолженіи беременности, особливо привыкшимъ, оныя позволишь можно.

---



## КНИГА ТРЕТІЯ.

О болѣзняхъ, кои беременнымъ  
женамъ, отъ начала зачатія,  
до окончанія родовъ, при-  
ключаются.

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

О странномъ вкусѣ, или побужденіи къ яде-  
нію необыкновенныхъ веществъ.

1. Обыкновенно случается, что почти каждая жена, какъ скоро отъ плодоноснаго зачатія со-  
дѣляется беременною, внутренно въ себѣ самой  
ощущаетъ особое побужденіе къ употребле-  
нію таковыхъ веществъ, коихъ она прежде бере-  
менности никогда не употребляла, и нисколько  
не позывала къ онымъ въ себѣ не чувствовала.

2. Причина сего, столь необыкновеннаго  
и страннаго побужденія, въ беременныхъ же-  
нахъ примѣчаемаго, зависитъ наипаче отъ  
перемѣны прежде бывшаго ихъ состоянія. Она  
обрѣщается въ самыхъ ихъ нѣдрахъ, или вну-  
тренностяхъ, кои служатъ варенію пищи и  
питательныхъ соковъ опдѣленію. Она не что  
часть III. Б инное



инное есть, какъ кислоѣа и мокротная оспа, ничемъ инымъ непреодоливаемая, какъ только тѣми самими веществами, кои съ толикою прихотливостію отъ многихъ беременных употребляются.

3. Мнѣніе тѣхъ, кои думаютъ, что беременная, имѣющая не обыкновенныя прихоти и спранныя побужденія къ употребленію сверхъестественныхъ вещей, и онымъ удовлетворяющая, собственному своему здравію вредить можетъ; есть во все не справедливое. Извѣстно, что напр. многія беременныя охотно грызутъ мѣлъ, известъ, глину, кирпичъ, пѣсокъ, черепашки, сѣру, уголь: съ особливою жадностію жуютъ и глотаютъ кожу, хлопчатую бумагу, охлопки, замаранныя вѣтшкіи и всякую нечистоту. Многимъ весьма отлично нравятся не созрѣлые плоды, сырое мясо, соленая рыба, соль, пряныя коренья, перецъ, уксусъ, снѣгъ, ледъ и проч. При всемъ томъ отъ употребленія таковыхъ веществъ онѣ не чувствуютъ въ себѣ никакой порчи своему здравію, Такое болѣзненное состояніе иногда и дѣвамъ, весьма рѣдко мушкетерамъ, и по не многимъ, особливо ипокондрикамъ, приключается.



4. Таковая оспрота въ тѣлѣ беремен-  
ныхъ раждается во первыхъ отъ переменъ  
въ кровообращеніи воспослѣдовавшей: во вто-  
рыхъ отъ сильнаго, во время беременности  
бывающаго, чувственныхъ жилъ раздраженія:  
и прѣше, отъ испорченнаго мысленнаго  
воображенія.

5. Такое беременныхъ женъ состояніе, хо-  
тя въ самомъ дѣлѣ есть немощное и болѣзнен-  
ное: однако не можетъ оно быть для нихъ  
ни вреднымъ, ни опаснымъ, если только бла-  
го разумный врачъ, всегда подражая природѣ,  
всячески старается ей пособствовать, а  
не сопротивляясь спасительному ея побужде-  
нію; копорая, особливо въ семъ случаѣ, по-  
казываетъ ему и средства и способы, къ оп-  
ращенію и излеченію болѣзнетворныхъ при-  
чинъ поспѣшествующіе.

6. Если беременная въ себѣ чувствуетъ  
неуполимое желаніе грызть, жевать, или  
глопаять такія вещества, копорыя большею  
частью состоятъ изъ земляныхъ частицъ;  
то сіе самое означаетъ кислоту въ желу-  
дкѣ и кишкахъ обрѣтающуюся; слѣдственно сіе  
самое показываетъ, что въ такомъ случаѣ  
наипаче пользуютъ лѣкарства, кислоту вса-  
сывающія, какъ то: раковыя жерновки, пе-



режженные яичныя скорлупы и черепашки, бѣлая магнезія, роспворѣ соли винного камня: кушанье больше швердое чѣмъ житкое, и проч. или лѣкарство подѣ No. 6. означенное.

7. Если беременной крайне хочется чего-нѣесть кислого, то сіе означаетъ алкалическую кислоту, во внушренностяхъ преодоляющую; въ такомъ случаѣ полезнымъ считается пища, вкусу сообразное, кисловатое, съ ципроннымъ, смородиннымъ или клюквеннымъ сокомъ смѣшенное, кисловатыя соли, пища такомужѣ вкусу соотвѣтствующая, и лѣкарство подѣ No. 7. приличное.

8. Если беременная съ чрезмѣрною жадностію желаетъ употреблять сольныя, копченныя и пряныя вещества, что извѣляетъ бытіе и изобиліе густыхъ и клейкихъ мокротъ, коими внушренности обременяются; въ такомъ случаѣ можно очистишь оныя сперва слабительнымъ подѣ No. 3.; а по томъ давать порошки подѣ No. 8. или 9 предписанные.

9. Пища вообще беременной, сему припадку подверженной, причислуется сухая, швердая, питательная, нежирная и мокротъ не раждающая. Жареная шеляпина, баранина, цыплята, рябчики, и прочее сему подобное, заѣсъ предпочищается всякому другому жидкому



кому и многосочному кушанью. Въ пищу можетъ служишь старое и доброе пиво и виноградное вино, умеренно употребляемое. А вмѣсто чаю настоивать горькія травы, инасипоянную воду пишь ежедневно, или взваръ подъ No. 10 и 11 предписанный.

---

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

Объ отвращеніи отъ пищи, тошнотѣ, позывѣ на рвоту, и о настоящей речотѣ.

### *I. Отвращеніе отъ пищи.*

10. Отвращеніе отъ обыкновенной пищи и питья часто приключается беременнымъ женамъ наипаче въ первые мѣсяцы ихъ беременности.

11. Сей припадокъ почти всегда есть предзнаменованіемъ худого состоянія беременныхъ; и имѣетъ свое начало отъ разныхъ причинъ, изъ коихъ главнѣйшія суть сіи: чрезмѣрные тѣлесныя испраженія, обремененіе и напыщеніе живота, поврежденіе желудка, вредное что нѣсть въ самихъ внутренностяхъ, варенію служащихъ, обрѣцающееся;



и на послѣдокъ спрванное побужденіе къ употребленію необыкновенныхъ веществъ.

12 Врачеваніе сего припадка, беременныхъ иногда въ крайнюю слабость приводящаго, поспѣшествуется разными способами, взглядомъ причинъ его производящихъ. Напр. если отвращеніе отъ пищи воспослѣдовало отъ чрезмѣрнаго испражненія низомъ или верхомъ; въ такомъ случаѣ нужно имѣть прибѣжище къ тѣмъ лѣкарствамъ, коими поносъ и рвота прекращаются, и о коихъ во своемъ мѣстѣ въ послѣдующихъ статьяхъ порознь объяснено будетъ. Если отвращеніе отъ пищи произошло отъ обремененія и напыщенія живота: или отъ чегоиѣсть вреднаго во внутренностяхъ кривошагося; то сему рвотными и слабительными легкими, коими оное изгоняется, пособлять должно. Если отвращеніе отъ обыкновенной пищи имѣетъ свое начало отъ спрваго побужденія къ употребленію необыкновенныхъ веществъ; то оное прекращается особливыми своими средствами, въ предвидуемой главѣ вычисленными. На послѣдокъ когда отвращеніе отъ пищи приключилось отъ поврежденія желудка, то сіе тѣмъ есть опаснѣе, чѣмъ порча, оное причинившая, есть сильнѣе, и вообще весьма трудно врачуется.



## II. Тошнота, и позывъ на рвоту.

13. Тошнота или поскливозь, есть почти непрерывное, или весьма частое позываніе на рвоту, хотя безъ всякаго дѣйствія.

14. Тошнота и отвращеніе отъ пищи обыкновенно бывають первыми слѣдствіями и беремености, и вскорѣ послѣ зачатія ощущаются; т. е. сіи припадки многимъ беременнымъ приключаются съ самаго того времени, какъ скоро онѣ очреваются, и продолжаются до 4 или 5 мѣсяцевъ беременности, а иногда даже до самого окончанія родовъ. Нѣкоторыя жены претерпѣваютъ сіи припадки не только чрезъ все продолженіе беременности, но иногда и по разрѣшеніи отъ оной, хотя и не столь часто.

15. Причины тошноты и позыва на рвоту, кои до половины беременности продолжаются, суть главнѣйшія двѣ: 1) многокрѣе, каждой почти беременной сродное, отъ прекращенія мѣсячнаго кровотеченія бывающее. 2) раздраженіе желудка, происходящее отъ раздраженія чувственныхъ жилъ, кои раздѣляются въ существѣ матки и желудка, и имѣють взаимобразное между собою сообщеніе.



16. Причина тошноты и позыва на рвоту, кои случаются при окончаніи беременности, имѣетъ свое начало отъ того, что матка будучи тогда чрезмѣрно разширенною, вверхъ поднимая чревные вкупренности, отъсюду оныя спѣсняетъ; кои равнымъ образомъ сожимаютъ и самой желудокъ.

17. Сіи припадки не должны казаться опасными для беременныхъ, особливо когда они бывають не весьма сильныя, а припомъ когда случаются только въ первыя времена беременности, не причиняя никакихъ худыхъ слѣдствій; напротивъ того, когда они долговременно безъ всякаго послабленія продолжаются, и оставляютъ по себѣ худыя слѣдствія; тогда должно всячески спараться о скорѣйшемъ ихъ прекращеніи, отвращая ихъ различными лекарственными средствами, коими унимають и самую рвоту.

### III. Рвота.

18. Рвота есть весьма сильное дѣйствіе желудка, отъ чрезмѣрнаго чувствительныхъ онаго жилокъ раздраженія бывающее; коимъ все то, что въ желудкѣ содержилося, верхомъ вонъ изгоняется и ршомъ выблевывается.



19. Причины, рвоту производящія суть тѣхъ самыя, отъ коихъ тошнота и позывъ на рвоту (15) приключаются.

20. Рвота беременнымъ женамъ приключается въ разные времена; т. е. инымъ только вскорѣ послѣ зачатія: инымъ до половины беременности: инымъ только при окончаніи и при родахъ: инымъ почти чрезъ все продолженіе беременности.

21. Рвота, въ началѣ или вскорѣ послѣ зачатія беременнымъ случающаяся, отвращается питательными, крѣпительными и усыпительными лѣкарствами. Маленькая ложечка двойной хлѣбной или Французской водки, внутренно употребленной при наступленіи рвоты, либо гофмановскія капли на сахарѣ, въ водѣ, или въ чаю принятыя, рвоту совершенно отвращаютъ. No. 14.

22. Рвота до половины беременности, или далѣ продолжающаяся, и при томъ частая сильная и жестокая, лучше всего отвращается кровопусканіемъ изъ руки, единожды или дважды учиненнымъ, особливо когда беременная есть многокровою. Нѣкоторые врачи совѣтуютъ, беременной пускать кровь изъ руки чрезъ каждыя 4 недѣли, за нѣсколько дней передъ тѣмъ временемъ, въ которое







сѣ шеляшиною и поваренными зелѣями, и ежедневно въ вечеру принимаѣть лѣкарспвенной бульонѣ подѣ №. 5. или усыпипельное лѣкарство подѣ №. 12. и 13. предписанныя.

24. Если въ беременной, которая рвотѣ есть подверженною, многокровія нѣтъ; въ такомѣ случаѣ кровопусканіе почитается не-  
нужнымѣ и бесполезнымѣ: но вмѣсто онаго лучше ей чаще повторять легкія слабительныя и усыпипельныя лѣкарства вышепоказанныя:  
(22. 23.)

## ГЛАВА ТРЕТІЯ.

О зубоболѣніи, главоболѣніи и омракахѣ.

### І. Зубоболѣніе.

25. Зубоболѣніе, или боль въ зубахѣ, часто беременнымѣ приключается въ разныя времена и отѣ разныхѣ причинѣ.

26. Причины зубоболѣнія суть ближайшія и отдаленныя. Одни имѣють свое начало отѣ раздраженія чувстввенныхѣ жилѣ, кои въ существѣ зубовѣ раздѣляются; а другія, раздраженіе производящія, суть сіи: многокровіе, изобиліе мокротѣ, сырой, влажный и холодный



лодный воздухъ, вожженіе десенъ, пища и пиѣе кислое, сладкое, холодное, или горячее, костреѣдица или гниль зубная.

27. Когда во время зубоболѣнія еще примѣчается и вожженіе въ деснахъ, то сіе буде не совершенно отвращается, по крайней мѣрѣ умалывается кровопусканіемъ, слабительными легкими часно повпоряемыми (23), припарками тепловатыми, пряными и душистыми, лѣкарспвами слинопеченіе производящими, пласпырями наливными къ вискамъ или около ушей приложенными, наѣченіемъ десенъ, пѣявицами къ самимъ деснамъ приставленными, полосканьемъ тепловатымъ усыпительнымъ, спирипуознымъ, предъохраненіемъ себя отъ холоднаго воздуха, препровожденіемъ спокойной жизни, впусканіемъ въ гнилой зубъ каплями перегнаннаго коричнеаго или гвоздичнаго масла, канфоры и проч. и на послѣдокъ когда зубъ гнилой шатается, то всего лучше оной скорѣе вырвать.

## II. Главоболѣніе.

28. Главоболѣніе, или боль въ головѣ, часто беременными претерпѣваемая, есть гораздо опаснѣе другихъ припадковъ, кои съ беременностью обыкновенно сопряжены бывающъ.



29. Головная боль иногда бываетъ постоянная, непрерывно и долговременно продолжающаяся: иногда она непорядочно и только въ извѣстные времена возвращается, проходитъ и снова наступаетъ. Иногда цѣлая голова болитъ, т. е. повсюдная боль въ ней ощущается. Иногда боль есть частная, т. е. только половина головы, либо передняя или задняя ее сторона болитъ. Иногда боль только въ извѣстномъ мѣстѣ, власно какъ приколоченная, ощущается.

30. Причины сего болѣзненнаго припадка суть многоразличныя. А наипаче полнокрое, отъ прекращенія мѣсячнаго кровопеченія, происходящее, неумѣренное тѣлодвиженіе, чрезмѣрныя возмущенія душевные: многояденіе и напыщеніе желудка: паденіе или ударъ въ головѣ причиненной: долговременная прогулка съ открытою главою въ знойное лѣтнее время: и неумѣренность въ любострастіи, во время беременности, прихотямъ многимъ порабожденная. А особливо и большею частію сія болѣзнь рождается отъ поврежденія внутренностей, варенію пищи служащихъ, и самой матки.

31. Боль въ головѣ постоянно, непрерывно, и долговременно безъ послабленія продолжающаяся, есть всегда опаснѣе той, которая



порая только изъ рѣдка и не надолго беременнымъ случается.

32. Врачеваніе сея болѣзни поспѣшествуется разными внѣшними и внутренними средствами. Кровопусканіе въ главоулыніи, происходящее отъ многокровія, отъ солнечнаго зноя, отъ паденія, убою или удара, вскорѣ учиненное, приноситъ беременнымъ скорое и чувствительное облегченіе. Полезно пускать кровь не только изъ руки, но и изъ боевыхъ жилъ, и изъ яремныхъ кровеносныхъ сосудовъ; либо припускать пиявицы къ вискамъ, ко лбу и около ушей. Рвотныя отвращаютъ часто головную боль, напыщеніемъ и обремененіемъ желудка причиненную. Легкія слабительныя, разводящія, усыпляющія и уполяющія жаръ и волнованіе крови, по употребленіи объявленныхъ средствъ, не менѣе прочихъ нужными почитаются. Пища пользующаяся самая легкая, питательная, изъ похлебокъ состоящая. Въ пищѣ служить чистая вода, сыворотка, оршадъ, лимонадъ, кислышии. Гофмановскія капли съ чаемъ, или на сахарѣ часто принимаемыя приносятъ великую пользу. Наривные пластыри къ запятку, спину, или икрамъ прикладываемыя, либо лепешки изъ квашеннаго тѣста съ горчицею и уксусу-



уксусомъ приуготовленные, къ подошвамъ и ручнымъ кистямъ привязанныя, опшягивая мокроты къ нижнимъ частямъ, часто унижаютъ боль головную. Напоследокъ низпусканіе каплями холодной воды съ высокаго мѣста на самую головную макушку, также мытье ногъ въ водѣ, и преніе, часто повсюрюаемыя, производятъ удивительное дѣйствіе въ тѣхъ беременнхъ, кои спраждутъ долговременнымъ главоболѣніемъ.

### III. Омраки.

33. Омракъ, или обморокъ, есть внезапное и скоропостижное прекращеніе почти всѣхъ чувствій и движеній тѣлесныхъ; при чемъ въ спраждающей симъ припадкомъ бываетъ лице блѣдное, хладнымъ потомъ покрытое, бѣеніе боевыхъ жилъ и дыханіе едва ощупишельное.

34. Омраки беременнымъ приключаются въ разныя времена; и припадки ихъ иногда легкіе и сносные, иногда весьма трудные и тяжелые бывають. Въ разсужденіи большаго или меньшаго дѣйствія оныхъ ризличными именами отъ врачей называються.

35. Причины сего болѣзненнаго припадка имють свое начало отъ расположенія са-  
мого



мого сердца, желудка и матки. Первѣйшая изъ нихъ есть кровообращеніе воспрепятствованное, или внезапно прекратившееся. Сіе беременнымъ приключается отъ жестокой боли, отъ весьма благовонныхъ и душистыхъ веществъ, отъ чрезмѣрнаго зноя и жара, отъ оскудѣнія пищи, отъ истощенія крови и добрыхъ соковъ, отъ неумѣреннаго шлѣдженія, неспанья и бдѣнія долговременнаго, отъ сильныхъ душевныхъ возмущеній, отъ тоски, печали, страха и переполоха, отъ нечаяннаго зрѣнія змѣи, ехидны, крысы: и отъ жестокихъ проносныхъ и рвошныхъ лѣкарствъ и проч.

36. Омраки сильныя, частыя, внезапныя и долговременно безъ послабленія продолжающіяся, причиняютъ весьма великой вредъ не только самимъ беременнымъ, но и носимымъ въ ихъ утробѣ младенцамъ. Спраждающія омраками жены, по прошествіи такового припадка, власно какъ отъ сна воспрянувъ, пробуждаются съ произносимыми глубокими вздохами, ощущаютъ во всемъ тѣлѣ своемъ превеликую слабость, и отнюдъ ничего прошедшаго не помнятъ.

37. Когда беременная, впадши въ обморокъ, вскорѣ приходитъ въ чувство, и неощущаетъ въ



въ себѣ никакого безпокойствія, по сіе означаетъ, что она въ опасности находишься. Когдажѣ она, бывши поражена симъ припадкомъ, безчувственна долго лежитъ; когда при томъ возбудишельныя и возстановляющія лѣкарства, во уша ей вливаемые, опіюмъ не поглощаются, но потіасъ вонъ назадъ вытекающіи; по сіе почти всегда есть худымъ обстоятельствомъ ея состояніи предзнаменованіемъ.

38. Когда обморокъ долго продолжается, то должно безъ закоснѣнія пособлять спращудшей всякими средствами. Напр. положи беременную горизонтально, слегка качать, колебать и тереть все ея тѣло: омоча персты въ холодную воду спрыскивать у ней лице: къ ноздрямъ, вискамъ, ко лбу и около ушей прикладывать летучіе и душистые естества: какъ по, двосенной укеусъ съ канфорною водкою, гунгарскую водку, нашатырноі спиртъ: давать нюхать крѣкіе чихательные порошки: ко предсердію прикладывать бѣлой или ржаной хлѣбъ поджареной, винограднымъ или простымъ виномъ смоченной, и пряными зеліями посыпанной: верхніе и нижніе уды, кои оледѣнвають, слегка тереть фланелью сахаромъ накуренною, байкою, сушонками, и сверху обкладывать теплыми пологачастъ III. В тен-



пенцами: часто наспавливать промывательныя раздражительныя: прикладывавъ нарывныя пластыри, или рожки, банки и проч.

39. Крозопусканіе, во время воспослѣдовавшаго обморока, отнюдѣ неприличествуетъ, и больше можешъ беременную повредить, чѣмъ воспользовашъ; а найпаче когда омраки производяшъ отъ обремененія желудка. Лучше кидашъ кровь по прошествіи оныхъ, т. е. когда спраждающей возвратишся прежнее чувство. Послѣ чего нужно ей давать внутренно по немножку стараго винограднаго вина, коричной двоеной воды, и другія крѣпительныя, горькія и ободренію силъ способствующія лѣкарства. На послѣдокъ рвошныя и слабительныя, смотря по обстоятельствамъ, и здѣсь также имѣюшъ мѣсто. А паче всего добropорядочная жизнь и благоповеденіе, спокойный и веселый духъ, умѣренное тѣлодвиженіе, препровожденіе времени въ пріятныхъ упражненіяхъ, и надлежащее воздержаніе предъохраняюшъ беременныхъ отъ таковыхъ припадковъ.





## О многокровоїи.

40. Многокровоїе, или полнокровоїе есть чрезмѣрное доброй крови, въ шлѣбѣ беременной жены обрацающейся, изобиліе.

41. Причина, многокровоїе производящая, есть мѣсячное кровопіеченіе, кое у беременныхъ обыкновенно прекращается, и чрезмѣрные 9 мѣсяцей не имѣетъ своего испражненія. Сверхъ сего полнокровоїе рождается отъ всякой той пищи, которая много питаетъ, и отъ которой много питательныхъ соковъ въ шлѣбѣ ежедневно отдѣляется; а добрая кровь ежедневно опшуда прѣугошворяемая, непрерывно въ шлѣбѣ умножаяся, остается безъ всякаго испражненія. Напослѣдокъ умноженію многокровоїа много содѣйсвуетъ сидячая, уединенная и спокойная жизнь, веселыя мысли, безпечальный духъ, и довольное изобиліе во всякихъ, ко препровожденію жизни нужныхъ надобностяхъ.

42. Почти каждая беременная жена, по природному своему шлѣа сложенію и расположенію, и по причинѣ собственной беременності, дѣлается сугубо многокровою; и по тому ежеминутно находится въ немалой опасности, которая ей угрожаетъ потерянїемъ



жизни; ибо какъ большіе, такъ и малые сосуды кровеносные, отъ чрезмѣрнаго въ ея тѣлѣ крови изобилія, могутъ либо совсѣмъ разорваны быть, либо оною захряснувши и завалены бывши, лишиться свободного сообщенія и кровообращенія. Сверхъ сего много-различныя и поппи ежедневныя перемѣны, съ жизнію и со здравіемъ человѣческимъ приключаются, весьма рѣдко проходятъ, безъ причиненія тѣлу разнообразныхъ болѣзненныхъ припадковъ.

окрова 43. Знаки, по коимъ наступающее, въ тѣлѣ беременной, многокровіе различается, суть сіи: необыкновенная краска въ лицѣ, очахъ и на ланипахъ: главоболѣніе, зубоболѣніе и омраченіе зрѣнія, позывъ къ блеванью и рвотѣ: чрезмѣрное кровеносныхъ сосудовъ напряженіе: біеніе боевыхъ жилъ полное и твердое: неповоротливость, слабость и усталость во всемъ тѣлѣ оцуджаемая: непрестанная ко сну склонность; необыкновенный во всемъ тѣлѣ жаръ отъ слабаго тѣлодвиженія, или отъ другой маловажной причины рождающійся: біеніе сердца со дрожаніемъ и препетаніемъ чрезвычайное: непрерывное изъ очей водяной влаги теченіе съ явственнымъ возженіемъ: тяжелое дыханіе и одышка: кровотеченіе изъ



мапки : почечуй слѣпый или шекучій : судороги и корчи часныя и проч.

44. Многокровіе отвращается умаленіемъ крови, въ тѣлѣ изобилующей. Сіе дѣлается во первыхъ, чрезъ предохраненіе себя отъ всего того, что производитъ много припадательныхъ соковъ: а во вторыхъ, посредствомъ кровопусканія. Время къ сему едва опредѣлить можно. Почти въ каждомъ мѣсяцѣ беременной кровь пускашь дозволяется, особливо когда знаки многокровія, прежде вычисленные (41) обшпорятельсива беременной, и врачебное показаніе по повелѣваютъ. Въ семъ намѣреніи нѣкоторыя имѣютъ обыкновеніе, кидать кровь трижды во все время беременности, т. е. чрезъ каждые три мѣсяцы одинъ разъ: за каждымъ разомъ выпускаютъ крови отъ 6 до 8 унцовъ, и всегда изъ руки. Такое обыкновеніе не весьма есть хвальное, и не всегда имѣетъ мѣсто. Тѣ беременныя, кои во время преждебывшей своей беременности, случайно подверженными были не созрѣлымъ родамъ, или не доносивши выкинули; должны вновь очреватѣвши, заблаговременно себя пускашь кровь, а наипаче не ожидая трехмѣсячнаго исполненія своей беременности: и открывать жилу въ такое время, въ которое



онѣ, еще не бывши брюхашыми, имѣли обыкновенное мѣсячное кровотеченіе.

45. Послѣ кровопусканія, беременнымъ многокровнымъ, нужно имѣть и другія предбосторожности, служащія къ отвращенію впредь могущаго воспослѣдовать полнокровія. Чему найпаче пособствуетъ самое тонкое и легкое питаніе: чистая и холодная вода часто и въ маломъ количествѣ употребляемая: сонъ недолговременный: бдѣніе умеренное: тѣлодвиженіе и испраженія тѣлесныя порядочно и ежедневно продолжаемыя: и внутренно принимаемыя легкія слабительныя, испарину производящія, мочегонительныя и разводящія лѣкарства. Тѣмъ беременнымъ женамъ, которыя опасаются, или боятся кровопусканія, чинимаго ланцетомъ, можно съ не меньшимъ же успѣхомъ для уменьшенія крови, наспавливать рожки, банки, или пѣвицы.





## О кровотеченіи.

46. Кровотеченіе, очреватѣвшимъ женамъ во время ихъ беременності приключающееся, бываетъ двоякое; а именно, либо оно есть обыкновенное мѣсячное кровоочищеніе, во свое время открывающееся, либо болѣзненное кровотеченіе изъ матки.

## I. Мѣсячное кровотеченіе беременныхъ.

47. Немногія жены имѣютъ отъ природы такое строеніе и сложеніе шѣла, что у нихъ мѣсячное кровотеченіе бываетъ иногда, когда онѣ забрюхаштуютъ, въ обыкновенное свое время, и продолжается даже до 7 или 8 мѣсяцевъ. Оно имѣетъ свое начало отъ многокротія, отъ оспроты крови и отъ разслабленія кровеносныхъ сосудовъ. Весьма нужно вѣдать такое ихъ состояніе каждому врачу, ко-  
ему ввѣряется попеченіе о збереженіи здравія таковыхъ беременныхъ.

48. Знаки, по коимъ мѣсячное кровоочищеніе, во время беременності приключающееся отъ многокротія, различается отъ кровотечения болѣзненнаго, суть сіи: мѣсячная кровь, какъ и прежде беременності, только въ обыкновенное свое время наступаетъ, не долго



продолжается, цвѣтомъ бываетъ блѣднѣе, количествомъ меньше, испекаешъ мало по малу не кусками съѣдшимися, ни волоконцами, но каплями, не причиняя беременной ни боли, ни колотья въ животъ, ни слабости; и напоследокъ сама собою унимается и печь перестаетъ. Она имѣетъ свой источникъ не изъ самихъ внутреннихъ нѣдръ матки, но изъ кровеносныхъ сосудовъ рыльца матки; о чемъ не трудно удостовѣриться чрезъ перспное осязаніе, посредствомъ коего рыльце матки находится въ такомъ состояніи, что вышнее онаго устье нѣсколько мягчѣ и зіяющее, а внутреннее швержѣ, зжатое и закупоренное ощущается. Удостовѣрившись въ томъ, что такое кровотеченіе есть обыкновенное мѣсячное, надлежитъ еще тщательнѣе изслѣдовать, въ самомъ ли дѣлѣ оно происходитъ отъ избытка крови; что также легко узнать можно, по симъ примѣчаніямъ: во первыхъ, когда беременная есть многокровнаго сложенія отъ природы; а во вторыхъ, когда она всегда имѣла избыточное кровотеченіе мѣсячное и долго продолжавшееся тогда, когда она еще не была беременною.

49. Такое кровотеченіе въ продолженіи беремености бывающее, хотя есть и не опасно;



сно: однакожъ дабы многокровоіе, яко причина онаго, не произвело худыхъ слѣдствій; нужно беременной, для предохраненія себя отъ оныхъ, имѣть сіи предосторожности: 1) чрезъ все то время, въ кое случается такое кровошеченіе, отъ всякаго шѣлодвиженія и упражненія сильнаго воздерживаться, и имѣть спокойной духъ: 2) отнюдъ не употреблять никакой пряной пищи, ни крѣпкихъ и разгорячительныхъ напитковъ: а довольствоваться мало пищащельными, разводящими и прохлаждающими: 3) всячески убѣгать прихотей и любострастія: 4) пусканъ кровь изъ руки за нѣсколько дней передъ шѣмъ, когда мѣсячному кровошеченію наступать должно, и сіе повторять каждой мѣсяцъ, пока беременная въ первой разъ почувствуетъ движеніе младенца во своей утробѣ.

50. Обыкновенное мѣсячное кровошеченіе, отъ острошпы крови, или отъ разслабленія кровеносныхъ сосудовъ происходящее, требуетъ особливаго вниманія. О сихъ обстоятельствахъ не трудно удостовѣриться по наблюденіямъ слѣдующимъ: во первыхъ, если настоящее кровошеченіе есть нарочитое, хотя беременная и не многокровнаго сложенія, и при шѣмъ слабосильна; а во вторыхъ, когда она пре-



жае своей беременноспи имѣла свое обыкновенное мѣсячное въ маломъ количествѣ, порядочно и не долго продолжающееся. Въ такомъ случаѣ не только нужно ей наблюдать всѣ вычисленные (49) предвѣспорожности: но еще сверхъ того употреблять лѣкарства крѣпительныя, клейкія, камеди, марціалыныя воды, и прохлаждающія вещества: всячески воздерживаясь отъ сильныхъ душевныхъ возмущеній, а особливо отъ гнѣва: и, если соспояніе ея позволяетъ, пускать не много крови изъ руки. Сверхъ того, когда беременная крайне отъ того ослабѣла, то нужно еще и сверху прикладываать къ животу тепловатыя крѣпительныя припарки подѣ №. 17. означенныя.

## II. Кровотеченіе болѣзненное.

51. Кровотеченіе болѣзненное нѣкоторымъ беременнымъ приключается большею частію въ первые, либо въ послѣдніе беременности мѣсцы. Сей припадокъ рѣдко проходитъ безъ причиненія худыхъ слѣдствій. Чего ради въ такомъ опасномъ случаѣ почти всегда требуется весьма скорая помощь, а иногда и приушествіе искуснаго врача.

52. Такое кровотеченіе, въ первыя времена беременности приключающееся, часто происхо-



исходитъ отъ того, когда зачатый во утробѣ зародъ не крѣпко утвердился, или когда дѣтское мѣсто съ которой нѣсть стороны отдѣлилося отъ матки. Но и въ продолженіи беремености въ разныхъ мѣсяцахъ оное случившя можеть отъ внезапнаго поползновенія, паденія, удара, лживаго шага; также отъ приподниманія ногъ высоко, отъ скачка, ношенія тяжелаго бремени на плечахъ, отъ лежанья на брюхѣ, отъ сильной печали, страха переполоха, гнѣва и проч. Всѣ таковыя случаи могутъ причинить кровотеченіе, особливо въ то время, когда беременная уже доспигла 8 или 9 мѣсяцей беремености. Слѣдственно ближайшая причина, такового кровотеченія есть дѣтское мѣсто, либо совсѣмъ, либо часпю только отъ матки отдѣлившееся; а отдаленныя онаго причины суть всѣ вычисленные случаи, также многокровіе, и вообще все то, что можеть причинить сильное въ крови беременной волнованіе. На послѣдокъ иногда оное кровотеченіе приключается отъ не извѣстныхъ внутреннихъ причинъ, а наипаче отъ того, когда дѣтская шепива многократно обвернулася кругомъ выи младенца.

53. Знаки, по коимъ кровотеченіе болѣзненное отъ мѣсячнаго кровоочищенія различается,



ся, суть сии: 1) когда у беременной крово-  
 шеченіе изъ матки случается не въ то вре-  
 мя, въ которое у неѣ прежде бывало обыкно-  
 веніе мѣсячное. 2) когда сіе кровошеченіе  
 приключается внезапно, съ великимъ изоби-  
 ліемъ и спремленіемъ, скоропоспѣжно пере-  
 сходитъ, потомъ спустя нѣсколько времени  
 снова печь начинается, и сіе дѣлается попе-  
 ремѣнно. 3) Когда кровь истекающая есть  
 жидкая свѣтло-красноватая, со вмѣшенными  
 длинными и темноватыми волоконцами, и пе-  
 чень безпрерывно, выходящая только въ то  
 время, въ кое застывшіе куски крови, на нѣ-  
 сколько минутъ запинаютъ путь сему пече-  
 нію. 4) Когда при томъ жестокая боль, пе-  
 реймамъ подобная, внутренно во чревѣ ощу-  
 щается. 5) Когда рыльца матки какъ вѣнечное  
 такъ и внутреннее усѣе растворилось столь-  
 ко, что безъ труда сквозь оное ручной  
 перстъ просунуть можно даже въ самую  
 впадину матки, и цѣмо примѣнно осязается  
 либо пузырь еще водами наполненный, либо  
 по истеченіи оныхъ, который нѣсть членъ  
 младенца ощущается. Всѣ сии знаки предъ-  
 являяшъ, что такое кровошеченіе, имѣя  
 свое начало изъ самихъ внутреннихъ нѣдръ  
 матки, есть въ самомъ дѣлѣ болѣзненное; а  
 по то-



по тому буде вскорѣ не прекрашися, то беременная, оному подверженная, можетъ бѣдственно выкинуть, или недоносивши родить.

54. Если кровотеченіе естъ не весьма сильное; если беременная въ себѣ не ощущаетъ переймовъ или родовой боли, предвозвѣщающей скоро приближающіеся роды; въ такомъ случаѣ, ради обыкновеннаго испытанія, не должно перстами еѣ ощупывать, дабы симъ образомъ не причинить въ ней вящее раздраженіе, а чрезъ то самое не воспослѣдовало бы еще большее кровотеченіе изъ матки. Сверхъ того, когда успѣе рыльца матки еще не растворилось, привсемъ же томъ кровотеченіе продолжается; то въ какомъ бы мѣсяцѣ беременности оное ни случилось, удобно унимается и прекращается однимъ кровопусканіемъ изъ руки, наблюдая при томъ сіе, дабы при выпусканіи крови, не давая ей свободнаго теченія, но пріоспанавливая оное; а сіе не трудно учинить, попеременно рукою давливая и сожимая кровеносную жилу, въ коей учинена нарочитая рана.

55. Послѣ кровопусканія, нужно для беременной имѣть крайнее въ пищу и питіи воздержаніе: довольствоваться одними питательными бульонами и застужеными похлебками.



ками: въ пиѣе упопребляѣе все то, что прохладжаѣе, напр. оршадѣ, лимонадѣ, марциаллыныя воды, либо чистую воду съ не болышымъ количествомъ ренского или другаго стараго вина, или съ лимоннымъ либо гранатовымъ сиропомъ смѣшиваемую: снаружи прикладываѣе, особливо къ нижней чрева части и кругомъ поясицы, тепловатыя крѣпительныя припарки, каковыя суѣ подѣ No. 17. предписанны: всячески предѣохраняѣе себя отѣ всего того, что горячитѣ, производитѣ внуѣренній жарѣ, и причиняѣе волнованіе въ кровообращеніи: напослѣдокъ по чаще принимаѣе лѣкарство подѣ No. 14. предписанное.

56. Еслижѣ кровопеченіе естѣ весьма сильное, и безпрерывно продолжается: если рыльце машки уже давно разшворилося; въ такомъ случаѣ все вычисленныя средства почтиаюся не довольными: но для прекращенія онаго требуѣе скорая и не укуснишельная помощь, которая въ томъ состоитѣ, дабы рукою скоро, проворно и искусно достать дитя, и съ его мѣстомъ вонѣ выняѣе; а по выняшій съ роженицею поступаѣе весьма бережно, какъ съ весьма болящею, предписавѣ ей умѣренность въ пиѣѣ и пиѣѣ, строгое



во всемъ воздержаніе, и частое употребленіе лѣкарствъ подъ Но. 12 или 13 означенныхъ, особливо по вечерамъ.

57. Здѣсь нужно вѣдать и сіе, что во время слабости, беременнымъ опѣ великаго кровопеченія приключаются, никогда не надлежитъ давать нюхать никакихъ крѣпкихъ духовъ, или летучихъ спиртовъ; пошому что опѣ таковыхъ вещей жаръ и волнованіе въ крови рождается.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

### О бѣли и бѣлой грыжѣ.

#### 1. Бѣль.

58. Бѣль есть не что иное, какъ бѣловатая и клейкая влага, изъ дѣпородныхъ мягкихъ частей иногда въ большемъ, иногда въ меньшемъ количествѣ испекающая, и въ разные времена, но не безпрерывно беременнымъ женамъ приключаящаяся. Она не всегда есть одинаковой важности, будучи иногда настоящею бѣлью, а иногда бѣлою грыжею.

59. Теченіе настоящей бѣли, у беременныхъ случающееся, имѣетъ свое начало найпаче опѣ прекращенія мѣсячнаго кровоочищенія, а  
иногда



иногда и отъ того, когда беременная, имѣя все шло назревающее, мягкое и нежное, изобилуешъ многими мокрощами худыми и нездоровыми, живешъ невоздержно, и не предъ-охраняешъ себя отъ любоспρασныхъ при-хошей. Оное приключится можетъ не только беременнымъ, но и самимъ дѣвамъ, не по-рочную жизнь препровождающимъ.

60. Знаки, коими шаковая бѣль отъ бѣлой грыжи отлчается, суть сїи: влага изъ дѣшпордныхъ часшей испекающая, бываетъ цвѣтомъ бѣлая, равнообразная, не имѣющая никакого худого запаха, не причиняющая никакой боли, и болышею частію не въ то время, когда обыкновенное кровоочищеніе прежде бывало, случается.

61. Когда теченіе бѣли есть непрерывное и весьма сильное, въ такомъ случаѣ надлежитъ заблаговременно отвращать оное сперва легкими слабительными, часто повтораемыми: потомъ кровочистительными, и наконецъ крѣпительными лѣкарствами; всегда наблюдая сїе, дабы не вдругъ и не скоропоспѣжно, но исподоволь шаковую бѣль умаляшь, отвращать, и совершенно врачевать.

62. У многихъ беременных женъ, при концѣ ихъ беременноши, или на сносахъ,



бываеѣтъ теченіе бѣли, ш. е. бѣлой, густой, клейкой и возгрівой слизи, иногда со вмѣшанными въ ней кровяными часпицами, или волоконцами. Такое испражненіе не еѣстъ припадочнымъ или болѣзненнымъ: но благодареніемъ природы, оному способствующей; ибо такая влага, изъ мягкихъ дѣшродныхъ часпей ошвсюду истекающая, смягчая оныя, шѣмъ самымъ пособствуетъ скорѣйшему ихъ разширенію, еѣдшвенно поспѣшествуетъ екорѣйшему и благополучнѣйшему родовъ окончанію; а потому и никакими лѣкарствами оному сопротивляться не должно.

## II. Бѣлая грыжа.

63. Бѣлая грыжа еѣтъ теченіе злой и нечистой бѣли, происходящей ошѣ нечистой крови, и ошѣ заразительной прилипчивости, чрезъ нечистое плошск е совокупленіе, беременнымъ женамъ сообщаемой: она равно беременнымъ, какъ и незамужнимъ случается.

64. Знаки, коими бѣлая грыжа различается ошѣ бѣли, суть сш: она обыкновенно бываетъ цвѣтомъ желтовата, иногда зеленовата, особливо когда на чистомъ полошнцѣ высохнѣтъ, запахомъ вонюча и злосмрадна, дѣшствіемъ ошѣ перьвоѣ ошлична, по елику буду-



чи оспра и бѣда, причиняетъ раны, язвы и чувствительную боль въ шѣхъ частяхъ, по коимъ имѣетъ свое печеніе; напоследокъ она испекаетъ непрестанно, даже и во время мѣснаго кровоочищенія, беременнымъ иногда случающагося.

65. Врачеваніе бѣлой грыжи надежнѣе, скорѣе и лучше поспѣшествуется проносными и кровочистишельными, часто повторяемыми лѣкарствами; а въ случаѣ застарѣлой и долговременной сей болѣзни, не бесполезно имѣть прибѣжище къ разнымъ внѣшнимъ и внутреннимъ, изъ ртутни состоящимъ, лѣкарственнымъ сослывамъ, коими вредная матерія разными спезями, а особливо чрезъ слюнопеченіе вонъ изъ шѣла изгоняется; а шѣмъ самымъ и упробное дѣло отъ наследственной болѣзни избавляется.

---

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

*О почечуй сѣломъ и отъдытомъ.*

66. Чечуй, или почечуй есть припадокъ болѣзненный, не только мужчинамъ свойственный: но часто и женамъ, особливо беремен-



мѣннымъ приключаются. Онѣ бываетъ двоякіи: т. е. почечуй слѣпый или сухой, и опкрытый или текуцій.

I. Почечуй слѣпый.

67. Почечуй слѣпый есть двоякаго вида: внѣшній или внутренній. Внѣшнимъ слѣпымъ почечуемъ называется то, когда снаружи около задняго прохода, во внѣшней кровеносной почечуиной жилѣ, подблжающія шишки возвышенныя, твердыя, величиною различныя, кровію напряженныя, числомъ одна или многія. А внутреннимъ слѣпымъ почечуемъ именуется чрезмѣрное отъ крови напряженіе внутренней почечуиной жилы, внутрь задней кишки сокрытое.

68. Сіи оба вида слѣпота почечуя имѣютъ свое начало отъ разныхъ причинъ, изъ коихъ главнѣйшіе суть сіи: многокровоіе беременнымъ обыкновенное: разширеніе матки: давленіе ею около лежащимъ часпямъ причиняемое: запоръ, завалы, и нечистота, чревные внутренности обременяющая.

69. Знаки, коими слѣпый почечуй отъ тяжчаго отличается, суть сіи: вопервыхъ тѣжбѣ самыя почечуиныя огухоли или шишки (67); а во вторыхъ сопряженныя съ ними припадки;



какъ то: боль въ поясницѣ, во всемъ хребтѣ и головѣ, почти безпрерывно ощущаемая, частые омраки, тяжелое испражненіе низомъ, запоръ и проч.

70. Врачеваніе какъ внутренняго, такъ и внѣшняго слѣпаго почечуя поспѣшествуется сперва внѣшними лѣкарствами, каковыя суть: промывательныя часто наставляемая, смягчительныя мази, и припарки (№. 19 20.), водяные пары, и кровопусканіе, посредствомъ пиявицъ, къ размягченнымъ почечуйнымъ шишкамъ, бережно прикладываемыя; а при томъ и внутренними прохлаждающими, боль успокояющими и растворяющими лѣкарствами подъ №. 22. 23. означенными.

## II. Почечуй открытый.

71. Открытый или текущій почечуй есть нечто иное, какъ наспоящее печеніе крови, происходящей изъ внутреннихъ или внѣшнихъ почечуйныхъ жилъ, иногда у брюхатыхъ женъ въ разныя времена беременности случающееся. Отсюда явствуетъ, что открытый почечуй, равно какъ и слѣпый, бываетъ внѣшній и внутренний, и отъ тѣхъ же причинъ (68) имѣетъ свое начало.

72. Знаки открытаго почечуя сами по себѣ явствуютъ. Беременная почечуйному кровопус-



вопеченію подверженныя не всегда имѣютъ оное въ равномъ степени; ш. е. иногда въ великомъ, иногда въ маломъ количествѣ, иногда только каплями, при каждомъ испражненіи низомъ, почечуйная кровь вонъ испускаетъ заднимъ проходомъ.

73. Если открытый почечуй есть умѣренъ: если только временно у беременной. приключается: если беременная опъ того не чувствуетъ ни боли, ни слабости, ни другаго безпокойствія: въ такомъ случаѣ никакія лѣкарства опнюдъ не нужны; но все дѣло единой природѣ, вредное изъ шѣла своими спезями испражняющей, предъоснавляется. Когдажъ почечуйное кровошеченіе у беременной есть весьма сильное, и опши безпрерывно и долговременно продолжающееся, а при томъ ей причиняетъ чувствительную боль, слабость, и оскудѣніе жизненныхъ соковъ; въ такомъ случаѣ надлежитъ заблаговременно пещися о томъ, дабы мало по малу а не вдругъ оное умалашъ и опшвращать, какъ внутренними прохладжающими, и крѣпительными; такъ и внѣшними вяжущими лѣкарствами, марціальными водами, припарками тепловатыми подъ No. 17 означенными квасцами, и повтореннымъ изъ руки кровопусканіемъ.



О невареніи желудка, мытъ, кровавомъ  
поносѣ, и поносѣ со рвою.

74. Беременнымъ женамъ часто и въ разные времена приключается невареніе желудка, мытъ, кровавый поносъ, рвоша съ поносомъ: припадки неукоснительной помощи требующіе, для предохраненія беременной отъ того, дабы она бѣдственно не выкинула.

#### I. Невареніе желудка.

75. Невареніе желудка есть такой болѣзненный припадокъ, когда пища въ немъ содержащаяся, испражняется низомъ такова, какова она была прежде употребленія, ш. е. сырая и почти ниско не перемѣнившаяся и не сварившаяся. Что нерѣдко и въ разное время беременнымъ случается.

76. Причины сего припадка суть сии: напыщеніе чрева: чрезмѣрное обремененіе желудка: оспроша, язвы и расслабленіе чревныхъ внутренностей, кои служатъ варенію пищи и питательныхъ соковъ сподвѣденію: простуда: сильныя душевныя возмущенія и прочая. Иногда сей припадокъ съ жестокою болью и колющемъ сопряженъ бываетъ.



77. Сей припадокъ для беременнѣхъ есть весьма опаснымъ. По чему заблаговременно надлежитъ его отвращать. Беременная оному подверженная должна всячески воздерживаться отъ всякой сырой, тяжелой и не скоро сваривающейся пищи: употреблять только такую, которая есть легкая, тонкая, не много питательная, и скоро въ желудкѣ сваривающаяся безъ отягощенія онаго; и часто пить чистую хлѣбную воду со старымъ краснымъ винограднымъ виномъ смѣшенную, либо такую, въ которую раскаленное желѣзо опущено было. Сверхъ того внутреннѣя горькѣя и крѣпительныя, и кислѣтъ сопротивляющіяся дѣйствію приносятъ не мадую пользу. Небезполезно давать по временамъ кусочками Армудовы плоды, или померанцы въ сахарѣ варенные: по вечерамъ принимать составъ, подъ No. 30. предписанной а старужи прикладывающій около предсердія тепловатая припарки, изъ благовонныхъ травъ, въ виноградномъ винѣ сваренныхъ, подъ No. 29. означенныхъ. При чемъ нужно телесное и душевное спокойствіе, и опочиванье въ тепловатой постелѣ.

II. Мытъ или простый поносъ.

78. Мытъ, или простый поносъ, есть частое, или почти непрерывное низомъ испраж-



неніе пищи, уже сварившейся въ желудкѣ, со многими мокротами; причемъ колошье, боль и рѣзь въ животѣ одущаются.

79. Мышѣ у беременнхъ случается отъ вышеобъявленныхъ причинъ (76); и неменьше есть для нихъ опаснымъ; однакожъ когда онѣ есть не жестокѣ: когда испраженія бывають не частыя и не сильныя: когда позывъ къ яденію есть порядочный: когда желудокъ совершенно варитъ; таковой поносъ, будучи полезенъ здравію, не требуетъ лѣкарствъ, коими онѣ прекращается; особливо въ самомъ его началѣ скоростпжно его прекращать не должно; нужно только имѣть добропорядочное въ пищѣ и питъи воздержаніе.

80. Когда мышѣ есть весьма сильный, безпрерывно и почти чрезъ цѣлые чепыре или пять дней безъ послабленія продолжающійся: въ такомъ случаѣ должно скорѣ приступитъ къ лѣченію: и сперва дать поупру составъ лѣкарственной подѣ No. 24; которой и повторитъ чрезъ два дни; потомъ въ вечеру наставитъ промывательное подѣ No. 25, а къ ночи составъ усыпительной подѣ No. 26. прописанныя; и сіе повторитъ ежедневно. Когда мышѣ имѣетъ свое начало отъ оспроты и ѣкосни мокротъ; въ такомъ случаѣ полезными почишаются камеди, бишья



шья масла, кислому всасывающія и проч. для утолненія внутрененной боли не бесполезно смазывать животъ смягчительною мазью, или прикладывать подобной тому пластырь: въ пищу и питье употреблять только то, что есть мало питательное, легкое, тонкое, и слабому желудку не вредящее.

### III. Крoвaвoй поносъ.

81. Крoвaвый поносъ, есть почти безпре-  
спанный позывъ къ испражненію нечислотъ  
низомъ, съ настоящею кровію смѣшенныхъ,  
и съ ощущеніемъ жестокой боли и колотья въ  
животъ. Сія болѣзнь есть для беременныхъ  
наипаснѣйшею.

82. Крoвaвый поносъ у беременныхъ иногда  
случается наипаче отъ нечистотъ, кои не-  
скоро свариваяся обременяютъ чревыя внут-  
ренности: также отъ худой и нездоровой пи-  
щи, отъ не созрѣлыхъ плодовъ, отъ употре-  
бленія новаго вина или другихъ не брожен-  
ныхъ напитковъ, отъ оспропы и ѣдкости,  
и отъ простуды.

83. Припадки, съ крoвaвымъ поносомъ сопря-  
женные, суть сіи: сперва отвращеніе отъ пищи,  
тоскливость, напыщеніе, боль около предсер-  
дія, позывъ на рвоту, и рвота примѣчающіяся;



по томъ колотье, боль и рѣзь въ животѣ, жаръ во всемъ тѣлѣ, неутолимая жажда, и настоящая лихорадка, съ непрерывнымъ позывомъ ко испражненію низомъ, умножающіяся. Всѣ сіи припадки начинающіяся, продолжающіяся и окончающіяся такъ, что извѣстное время къ перемѣнѣ на лучшее предъопредѣлить трудно. Равномѣрная по всему тѣлу испарина, и моча съ изобильною осадкою истекающая часто предвѣщаютъ добрую о выздоровленіи болящей надежду. Напротивъ того непрерывная икота, рвота, судорга и корча усиливающаяся, а при томъ внутренняя боль, внезапно прекратившаяся, суть дословѣрнымъ наступающаго Анипонова огня предзнаменованіемъ.

84. Врачеваніе кроваваго поноса доспавляется разведеніемъ оспроты, во внутренностяхъ гнѣздящейся: испребленіемъ вредныхъ нечистотъ различными спезами: укрощеніемъ и усиленіемъ внутреннихъ движеній, болѣзнетворными началами причиненныхъ: и укрѣпленіемъ ослабѣвшихъ внутренностей.

85. Для разведенія оспроты пользуется питье клейкое, какъ то: яменная или овсяная вода, ромашковые или проскурняковы цвѣты, вмѣсто чаю употребляемые: смягчительныя промывательныя, приуголовленные изъ  
смяг-



смягчительныхъ справъ, шрухмаля, деревяннаго или льнянаго масла, почаще насцавливаемая, или подѣ No. 19. прописанное.

86. Для истребленія вредныхъ нечистотъ изъ тѣла много пособствуютъ: сперва кровопусканіе, потомъ рвотныя и слабительныя самыя легкія, исподоволь спраждающей поносомъ данныя, и подѣ No. 4. и 3. означенныя.

87. Для усиленія внутреннихъ движеній и утоленія боли, особливо похваляется сонное зелье, и изъ него составленные различные лѣкарственныя составы. No. 12. 13.

88. Для возстановленія крѣпости и ободренія силъ, во внутреннихъ разслабѣвшихъ производитъ отличное дѣйствіе известная наспоянная съ прижареною хлѣбною коркою, или марциальная вода, сыворотка, парное свѣжее молоко, и лихорадочная корка, съ другими горькими лѣкарствами въ маломъ количествѣ часто употребляемая; однакожъ крѣпищельныя и вяжущія лѣкарства только при концѣ болѣзни приличествуютъ.

89. На послѣдокъ, по елику кровавый поносъ часто бываетъ прилипчивымъ, но для предохраненія отъ заразы онаго, беременнымъ нужно всячески беречься того, чтобъ неимѣть сообщенія съ такими больными, кои въ самомъ



самомъ дѣлѣ спраждунъ симъ припадкомъ : не испражняйся шамъ, гдѣ подверженныя оному испражняющіяся, или прежде испражнялися : содержащъ себя во всемъ добропорядочно и благоумѣренно : одѣвать все шѣло равномерно тепло : и отнюдѣ не выходить на открытой воздухъ въ сырую и мокрую погоду.

90. Беременнымъ иногда приключается частый позывъ къ испражненію низомъ, но безъ всякаго дѣйствія. Сей припадокъ нерѣдко отъ вышеозначенныхъ причинъ имѣетъ свое начало ; а по тому и отвращается вычисленными средствами. Парная баня, а особливо пары теплые водяные, или укусные, надъ коими сажаютъ женъ беременныхъ, приносятъ въ семъ случаѣ скорую помощь и облегченіе.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

### О безпрерывномъ теченіи и залорѣ мочи.

#### I. Безпрерывное теченіе мочи.

91. Безпрерывное теченіе мочи есть неудержаніе, или непрестанное противу воли истеченіе урины каплями. Сей припадокъ часто



сто беременнымъ приключается наипаче въ послѣдніе времена беременности; а по окончаніи родовъ совершенно перестаетъ. Слѣдственно единое ко преодоленію онаго средство состоитъ въ терпѣніи.

92. Причиною сего припадка бываетъ дѣтская головка лежащая надъ мочевымъ пузыремъ, и давленіемъ своимъ его раздражающая такъ, что онъ не можетъ свободно во всѣ стороны раздаваться, и въ себѣ вомѣщать мочу, непрерывно мочильниками въ него изливаемую: но немедленно изъ себя выпускаетъ оную мочеиспускательнымъ стволѣмъ.

93. Сей припадокъ едва есть опасенъ, выключая токмо то, что моча непрерывно истекающая, будучи иногда остра и ѣдка, легко можетъ причинить воспаленіе и язвы на вѣшнихъ мягкихъ дѣтородныхъ женскихъ частяхъ. Для отвращенія сего лучшее и надежнейшее средство состоитъ въ томъ, чтобъ беременная побольше спокойно въ постели опочивала, при чемъ ягодицами своими лажала бы она такъ, чтобъ положеніе ихъ было нѣсколько выше прочихъ частей. Когдажъ нужда заставитъ беременную, оспавить свою постелю, и ходитъ: въ то время надлежитъ ей искусно привязать особливую машину, съ при-



пришитую къ ней гредкою губою, или съ привязаннымъ пусшымъ пузыремъ ( зри рис. 32. IV. V. ), куда моча испекающая прямо моглабы входить, ни мало не касаяся прочимъ мѣжнымъ мягкимъ частямъ.

## II. Запоръ мочи.

94. Запоръ мочи беременнымъ часто приключается между вторымъ и четвертымъ мѣсяцемъ ихъ беременности. При чемъ онъ ощущая внутренно ко испусканію мочи побужденіе, либо претерпѣваютъ въ томъ великую трудность, либо опиюдъ мочиться не могутъ.

95. Причины запора мочи главнѣйшія суть сїи: 1 ) не малая тяжесть матки, иногда въ самую яму таза низпадающей, и давленіемъ своимъ сожимающая выю мочевого пузыря. Чему наипаче подвержены бывають тѣ жены, кои передъ тѣмъ уже спрадали низпаденіемъ матки, либо имѣли случайное паденіе, ударъ въ животъ и проч. 2 ) воспаленіе мочеиспускательнаго ствола, мочевого пузыря и дѣтородныхъ частей. 3 ) каменная болѣзнь въ мочевыхъ стезяхъ гнѣздящаяся.

96. Припадки, запоромъ мочи причиняемые, суть сїи: чрезмѣрная въ животъ опухоль, ража  
дающ



дающаяся отъ того, что мочевиный пузырь, мочею въ немъ непрестанно скопляющуюся чрезмерно расширяется, а отъ того и нижняя чрева часть, отъ лобка до самого пупа и далѣ, на подобіе барабана распрянувшись, выпучена и раздута примѣчается: отъ чего внутри рождается у беременной жестокая боль: біеніе боевыхъ жилъ твердое, полное и скорое: возженіе мочевого пузыря и прочая; въ такомъ случаѣ если помощь спраждающей вскорѣ подана не будетъ, то не избѣжная смерть ей предлежитъ.

97. Знаки, коими запоръ мочи, отъ первой причины происходящій, опличается, суть сїи: 1) добропорядочное испражненіе низомъ, безъ потечуныхъ припадковъ, и безъ боли: 2) когда чрево у беременной, ея собственными, или чужими дланями бываетъ приподнято, то беременная въ то самое время гораздо свободнѣе мочится, чѣмъ передъ тѣмъ: 3) тожъ самое примѣчается, когда она на колѣна присядетъ, или встѣмъ шуловищемъ напередъ посклонится.

98. Совѣты врачей, сему припадку победить спарающихъ, состоятъ въ томъ, дабы мочевымъ выпускникомъ выпускать мочу сія жена спраждающимъ. Сіе средство хотя есть и безопасное



зопасно и испытано: однакожъ сопряжено съ нѣкоторымъ безпокойствомъ, какъ для самой беременной, такъ и для бабки или повивального врача; ибо никакъ нельзя за однимъ разомъ совершенно оповратить сего припадка, потому что ежечасно моча опадѣляющаяся, и непрерывно въ мочевоомъ пузырь умножающаяся, требуетъ почти непрерывнаго труда и искусства, нужнаго какъ въ наставляваніи сего орудія, такъ и въ выпусканіи онымъ мочи запершейся. А какъ не рѣдко запоръ мочи приключается отъ давленія матки низпадающей, и выю мочевого пузыря, либо весь мочеиспускательной стволъ прижимающей къ лоннымъ костямъ: какъ сіе явственно доказывается тѣмъ, что когда въ такомъ случаѣ двумя перстами, въ рукавъ матки запущенными, рыльце матки бываетъ отведено отъ оныхъ костей на средину таза, тои часъ и запершаяся моча свободно вонъ испекать начинаетъ. Въ разсужденіи сего лучшее къ отвлращенію сего припадка средство состоятъ въ томъ, дабы особливымъ кольцомъ (Рис. 33. III.-VII.) въ рукавъ матки вправленнымъ поддерживать низпадшее рыльце матки; чѣмъ не только оное сохраняется въ прямомъ своемъ положеніи, но и предбохраняется отъ иного, дабы оно болѣе внизъ не опуска-



опускался, и не сжимало мочеиспускательного сшвола.

99. Запоръ мочи, при окончаніи беремен-  
ности, беременнымъ принимаемый дѣтскою  
головкою, шѣмачкомъ къ лоннымъ костямъ  
прижатію, и сдавливающею мочеиспускатель-  
ной сшвола, опирается 1) шѣмъ, когда  
беременная, онымъ спирахуя поконится  
больше на своей постелѣ, и при томъ наблю-  
даютъ шѣе положеніе, да бы крестецъ ле-  
жалъ нѣсколько выше прѣаго шуловидіа,  
2) опведеніемъ дѣтской головки ошѣмъ лон-  
ныхъ костей, помощію ручныхъ перстновъ:  
3) выпусканіемъ мочи посредствомъ моч-  
ваго выпускника. и 4) удержаніемъ рыльца  
машки въ своемъ положеніи чрезъ кольцо.

100. Запоръ мочи, происходящій ошѣмъ вож-  
женія мочеваго пузыря, мочеиспускательнаго  
сшвола или вышнихъ мягкихъ дѣтородныхъ  
частей, разпознается по симъ примѣнамъ: 1)  
когда беременная въ шѣхъ самыхъ частяхъ  
чувствуетъ жестокою боль, рѣзь и колошье.  
2) когда она при всемъ томъ будучи мно-  
гокровна, ешѣ подвержена почечуйнымъ при-  
падкамъ, и одущаетъ въ шѣхъ частяхъ  
сильное раздраженіе.



101. Лучшее и надежнѣйшее къ отвращенію сего припадка состоитъ въ томъ, дабы немедленно выпустивъ мочу объявленнымъ образомъ (98). Послѣ чего тотчасъ пускнѣ ей кровь изъ руки: потомъ часто ей насплавивать смягчительныя промывшья, особливо изъ тепловатой сыворотки, овсяной или ячменной воды, и деревнаго масла либо меду прѣготовленные: снаружи прикладывать смягчительныя припарки тепловатыя: липаніе имѣть самое тонкое, легкое, охлаждающее и жаръ уполяющее: въ прочемъ имѣть шѣлдвиженіе весьма умеренное; и паче всего воздержаться отъ любострастія и прихотей.

102. Запоръ мочи, беременнымъ причиняемый каменною немочью, распознается по шаковымъ примѣтамъ: 1) когда беременная внутренно ощущаетъ боль въ мочевомъ пузырь и около паховъ, съ позывомъ на рвошу. 2) когда моча испражняемая есть сырая, не сварившаяся, часто и въ маломъ количествѣ, съ пѣскомъ или избыточною осадкою кирпичнаго цвѣта вонъ испускаетъ. Сіи знаки, поелику не всегда предзнаменуютъ настоящую каменную болѣзнь; того ради для лучшаго въ томъ удостовѣренія 3) особый щупъ или мочеый выпускникъ, искусно



наспавленный, оную открыть можетъ. Трудно иногда сіе производися въ дѣйствию, особливо когда камень находится въ самомъ мочеиспускательномъ стволѣ; однакожъ благоразумный врачъ мочетъ къ тому найти средство и способъ, о коихъ здѣсь подробно объявлять мѣсто не позволяемъ.

193 Припадки, запоромъ мочи беременнымъ часто причиняемые, и оныя часа на часъ усиливающіеся отворачиваются наиболѣе кровопусканіемъ: часнымъ наспавливаніемъ смягчительныхъ промывательныхъ: прикладываніемъ тепловатыхъ смягчительныхъ припарокъ: пишемъ ячменной, овсяной и известной воды: пищею самою легкою и тонкою: часнымъ употребленіемъ лѣкарственнаго состава подъ No 27. означеннаго. Если при продолженіи всего сего, беременная не чувствуетъ никакого облегченія: въ такомъ случаѣ нужно ей, сверхъ всего того, еще садиться въ тепловатую ванну, или сидѣть надъ теплыми парами, коихъ силу еще болѣе умножаютъ смягчительныя травы и корни. При всемъ же томъ крайне воздерживаться любострастія и душевныхъ возмущеній.



## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

## О низпаденіи матки и задней гишки.

## I. Низпаденіе матки.

104. Низпаденіе матки есть такой припадокъ, когда матка рыльцемъ своимъ гораздо ниже обыкновеннаго низходитъ въ самую яму шаза, либо къ самому вышнему устью рукава матки опускается. Сей припадокъ въ разные времена беременности случается.

105. Причины низпаденія матки суть сии: сложеніе тѣла мокротное: преждебывшіе трудные и ненатуральные роды: неосторожные бабичьи повороты: жестокіе переимы: паденіе и удары: упражненіе и тѣлодвиженіе неумѣренное, нѣйпаче вскорѣ послѣ первыхъ родовъ учиненное: неосторожное и скоропостижное вынятіе дѣтскаго мѣста: расслабленіе связокъ матки: и яма шаза женскаго весьма обширная.

106. Знаки, по коимъ низпаденіе матки у беременной случившееся, примѣчается, суть сии: рыльце матки низходитъ и опускается внизъ по ши до самаго вышняго устья рукава матки, такъ, что не шокмо оно перстами осязати, но иногда даже и очами видѣти



можно. Во время прикосновенія ощущается шло мягкое, упругое, кое будучи шолкнуто, назадъ подается, но по шомъ снова шолчасъ на грежное мѣсто возвращается. Единое беременной повѣщиваніе кѣ разпознанію сего припадка доващѣ, особливо когда она часто жалуется болью въ пахахъ и повснѣищѣ о душаемою, и нѣиначе въ то время, какъ она сидѣищѣ, похаживаетъ, одѣвается, и низомъ испражняется: когда онаа боль переспааетъ и унимается шолько тогда, какъ она спокойно лежищѣ въ постелѣ, и снова при воспаніи о душается. Першнее испытаніе въ семъ случаѣ едва нужно, развѣ для того, дабы чрезъ то лучше узнать, не содѣлалася ли въ низпавшей части опухоль и затвердѣлая окрѣпдосшь.

107. Средство самое лучшее и надежнѣишее кѣ опвржденію сего припадка состоищѣ въ шомъ, дабы приподнять машку, и удержашъ рыльце во свзѣмъ положеніи, помощію искусственнаго кольца (зри рис. 32), въ рукавъ машки влагаемого. Однакожъ чѣмъ дави е низпаденіе машки приключилось, шѣмъ шруднее она на свое прежнее мѣсто вправляется.

108. Лекарственные средства должны бытъ сообразны припадѣ, самой припадокъ при из-



ведшей. Напр. если низпаденіе матки у беременной случилось отъ удара, паденія или пришибовъ; въ такомъ случаѣ надлежитъ пустить ей кровь изъ руки, особливо когда еще при томъ она есть и многокровою: послѣ чего не бесполезно ей дать и легкое слабительное: а при томъ оному испражненію пособлять и смягчительными промывательными: при чемъ не должна она надуваться, ниже вставать съ постели ради испражненія. Вообще пища ей причествуетъ легкая, питательная, безъ оспягощенія желудка скоро сваривающаяся. Пищье тонкое, охлаждающее, и въпродъ не причиняющее. Покой ей неменьше нуженъ, какъ и воздержаніе въ питаніи. Спокойствіе духа столькожъ для неѣ нужно, какъ и успокоеніе тѣла. Чѣмъ болѣе она покоится, тѣмъ для неѣ лучше и полезнѣе. Въ постѣли она повинна лежать такъ, чтобъ голова ея была приподнята нѣсколько повыше груди: поясницею и крестцомъ она опиралася бы объ шюфкъ: а ноги были бы нѣсколько приподняты, скорчены, и въ семъ положеніи подложенною подушкою поддерживаемы. Болящей дозволяется опмѣнить такое положеніе, особливо въ ночное время, и даже такъ, чтобъ скорѣе и спокойнѣе



нѣе ей заснуть было можно. Ко внѣшнимъ нижнимъ чревнымъ частямъ нужно прикладывать тепловыя припарки крѣпительныя подѣ №. 28. 29. При употребленіи всего сего, покрайней мѣрѣ чрезъ 8 и и 10 дней полезно давать больной каждого вечера лѣкарства, подѣ №. 13 или 30. означенныя. Напослѣдокъ цѣлительныя воды, особливо маріѣальныя, внѣ и внутреннему употребляемыя полагаютъ конецъ сему врачеванію.

109. Примѣанія: 1 ) низпаденіе матки, женамъ беременнымъ уже въ лѣтахъ находящимся, случившееся, и долго безъ поправленія оставленное, едва одними лѣкарствами ( 108 ) отвращается; если при томъ не будетъ употреблено особое кольцо, рукою искусно вправленное, коимъ рыльце матки поддерживаемо будучи, препятствуетъ дальшему ея низпаденію, не причиняя беременной почти ни какого безпокойства. 2 ) Низпаденіе матки случившееся женамъ беременнымъ, кои еще въ молодыхъ лѣтахъ находятся, а особливо такой, которая еще въ первой разѣ отреванила, отвращается тѣмъ, когда беременная бережется всякаго упражненія и немнѣннаго шлодвиженія, и болѣею частію покойтся въ постѣли. При чемъ нужно ей на-



блюдаютъ и сіе: 1) кидаютъ немного крови изъ руки чрезъ каждыя 6 недѣль: 2) направляютъ себѣ часто промывательныя; 3) часто употребляютъ легкія слабительныя лекарства, особливо въ послѣднихъ мѣсяцахъ беременности; и 4) по окончаніи родовъ спускъ не вставать съ постели по крайней мѣрѣ чрезъ два мѣсяца.

## II. Выпаденіе задней кишки.

110. Выпаденіе задней кишки есть такой припадокъ, когда она изъ прохода вонъ выпадши виситъ. Приключается беременнымъ инаиже на сисахъ, или передъ родами, а иногда и послѣ родовъ.

111. Причины, выпаденіе задней кишки производящія, суть сіи: жестокіе переходы съ сильною напругою при родахъ, у беременной долгоременно продолжаются: непереносимость и недоворошилывость повивальной бабки, при родахъ прислуживающей, и не искусно перестави своими расширяющей заднюю рукава матки сторону, упомянутой кишки соопѣтствующую.

112. Лечение сего припадка доставляется надлежащимъ исправляніемъ выпавшей кишки на свое мѣсто, особливо тогда, когда дѣтская головка еще въ верхнемъ плазу находится



дится, и оная кишка ея некрѣтко прижата. Что дѣлается симъ образомъ: въ тѣ часнѣ положенца, смочивъ оное масломъ, и обвернувъ имъ указательной перстнѣ, слегка запускать его въ самой проходѣ, а по томъ и прочими перстами приподнимая кишку, мало по малу тудажъ вправлять оную. По вправленій же кишки, чрезъ нѣсколько времени задержавъ оной перстнѣ въ самомъ проходѣ, а не вдругъ его опшуда вынимать; послѣ чего бережно вынувъ запущенной перстнѣ, оставивъ тамо оное положение на малое время; а на послѣдокъ и оное слегка поворачивая съ одной стороны въ другую, по легонку вонъ вынать. По вправленіи задней кишки на свое мѣсто, надлежитъ часно къ самому проходу прикладывать тепловатыя вазущія и крѣпительныя припарки подъ №. 17. иногда беременной наставлятъ такіа промывательныя, въ коихъ нѣтъ никакой оспроны раздражающей. При чемъ родящая повинна непрерывно опочивать въ постелѣ, большею частію лежать спиною, ноги держать плотно одну возлѣ другой протянувши прямо, не скорчивъ и не растопыривая оныхъ, дабы вправленная кишка снова вонъ выпастъ не могла.

Когдажъ дѣтская головка уже низпусти-



лась въ самую яму паза, и находишься при самомъ отверстіи нижняго паза; въ такомъ случаѣ нельзя вправлять выпавшую кишку на свое мѣсто: но должно предвоспавить оную такъ, какъ она есть до того времени, пока беременная совершенно разрѣшилась отъ родовъ, коихъ скорѣйшему окончанію всячески поспѣшествовать нужно.

## ГЛАВА ПЕРВАЯНАДЕСЯТЬ.

### О судорогахъ, беременнымъ случающихся.

113. Судорога и корча есть сильное движеніе, или судорожное сокращеніе членовъ тѣлесныхъ, иногда независащее отъ воли или хотѣнія, и приключающееся беременнымъ въ разныя времена ихъ беременности, и въ разныхъ частяхъ тѣлесныхъ, какъ то: въ рукахъ, ногахъ, поясницѣ и проч. бывающее.

114. Причины, отъ коихъ судороги у беременныхъ случаются, суть сіи: многокровіе великое, или истощеніе и оскудѣніе доброй крови: умноженіе и спеченіе мокротъ въ одной тѣла части: слабость послѣ кровоизлитія воспослѣдовавшая: худая и нездоровая



ища: жестокіе персеймы: сильныя испражненія: запоръ мочи и проч.

115. Опасность оныхъ судорогъ тѣмъ есть больше, чѣмъ чаще беременныя оными спраждуютъ. Напротивъ того судорога не сильная, несчастая, скоро проходящая, и едва примѣтная, рѣдко опасностію угрожаетъ.

116. Врачеваніе судорогъ исполняется отвращеніемъ причинъ, производящихъ оныя. Напр. 1) Если судорога причинена многокровоіемъ, что означается краска и румянецъ, непрерывно въ лицѣ и на ланитахъ у беременной примѣчаемыя: бѣнѣ боевыхъ жилъ полное и твердое: и настоящее сложеніе тѣла полнокровное; въ такомъ случаѣ какъ скоро припадокъ минется, надлежитъ беременной пустить крокъ изъ руки, а иногда и повторить, смотря по обстоятельствамъ; часто напивавшась промывательныя смягчительныя: пищу употребляя легкую, тонкую питательную: и питье помужъ подобное; внутренно давать пощѣ лѣкарство усыпительное подъ No. 30 по ложечкѣ. Снаружи часто тереть спраждущія части посредствомъ тепловатой суковки, и смазывать лѣкарственнымъ мазью подъ No. 21. означенною При чемъ всячески защищать себя отъ холоднаго воздуха, содержа  
все



все шло въ надлежащей теплотѣ. 2 ) Если судорога имѣетъ начало отъ исподенія и оскудѣнія доброй крови, поперянной чрезъ кровошеченіе: что означаетъ блѣдность лица и біеніе боевыхъ жилъ весьма слабое; въ такомъ случаѣ нужно всячески стараться о томъ, дабы доброю и питательною пищею наградишь недостатокъ поперянной крови, и тако подкрѣпишь ослабѣвшія силы беременной. 3 ) Если судорога приключается отъ умноженія мокротъ: что означаетъ мокротное спражлудей сложеніе, и вѣншее шло обрюзглое разположеніе, худое питаніе и отъ пици отвращеніе; въ такомъ случаѣ надлежитъ отвращать оную легкими слабительными, мокроты испражняющими, промывательными смягчительными, часто употребляемыми: перемѣною доброй, здоровой и полезной пици, цѣлительными водами, и лѣкарствами противусудорожными. 4 ) Если судорога происходитъ отъ расслабленія шла, и оскудѣнія силъ, причиненнаго долговременнымъ неяденіемъ, сильнымъ кровопотеніемъ, и жестокими испрѣженіями; въ такомъ случаѣ покой шла и духа, здоровая и питательная пица, доброе спирое виноградное вино, и судорогамъ сопротивляющіеся средства, временно



менно употребляемая, вскорѣ обогрѣя и возвращая потеряныя силы, совершенно отвращающъ и самой припадокъ. 5) Напоследокъ если судорога случается отъ запора мочи: что легко узнается изъ того, когда моча у беременной отнюдѣ не истекаетъ, либо иногда течетъ только каплями, причиняя при томъ ей боль жестокую; въ такомъ случаѣ должно отвращать оную выше показанными средствами. (101. 103).

117. Нѣкоторыя беременныя иногда бывающъ подвержены только слабымъ судорогамъ, съ омраками сопряженнымъ: кои обыкновенно начинающъ слабостію, съ біеніемъ боевыхъ жилъ порядочнымъ: чувства у нихъ ослабѣвающъ: глаза замуривающъ: губы и ланиты краснѣющъ: уды непрерывно прясутъ; и на послѣдокъ онъ пришедъ въ чувство, ощущающъ въ разныхъ частяхъ тела легкое и сносное дѣйствіе судорогъ. Таковымъ для предохраненія отъ сего припадка, одни противусудорожныя лѣкарства доваляютъ. Въ прочемъ когда судорога непроходишь, и отъ часа на часъ усиливается, и жесточе мучитъ беременную; въ такомъ случаѣ единымъ только благополучнымъ родовъ окончаніемъ она прекращается.



## ГЛАВА ВТОРАЯ НАДЕСЯТЬ.

## О грудныхъ болѣзненныхъ припадкахъ.

118. Грудь, сосцы, или шишки, часто во время беременности бывающъ подвержены многоразличнымъ болѣзненнымъ припадкамъ: изъ коихъ главнѣйшіе суть сіи: боль въ грудяхъ и около предсердія: напряженіе, зашвердѣлость, вожженіе, наливъ, прѣчины въ самыхъ сосцахъ и сосочкахъ. Сверхъ того и внутренніе припадки, какъ то: кашель, тяжелая одышка и проч. беременнымъ часто приключаются.

## I. Боль грудная.

119. Боль грудная есть весьма непрятное, иногда жестокое, въ самихъ сосцахъ, беременными претерпѣваемое, ощущеніе и страданіе. Чему наипаче суть подвержены многокровныя жены, и тѣ, у коихъ обыкновенное мѣсячное кровотеченіе бываетъ всегда изобильное.

120. Причиною сего припадка есть частію прекратившееся мѣсячное кровотеченіе, частію же большее противъ прежняго, и въ большемъ количествѣ крови стеченіе къ самимъ сосцамъ.



121. Опасность шѣмъ есть больше, чѣмъ сильнѣе боль ощущается. Чего ради Ипократѣ совѣтуетъ, сколь можно, скорѣе оповращать оную; утверждая, что если вскорѣ надлежащая помощь подана не будетъ, то беременная опѣ того въ сѣумасшествіе впасть можетъ.

122. Врачеваніе сего припадка исполняется симъ образомъ: 1) когда боль въ сосцахъ есть легкая, и сносная, и шокмо около самихъ сосочковъ временно ощущаемая такъ, что иногда проходитъ, иногда снова возвращается: въ такомъ случаѣ лучшее къ тому предъохранительное средство есть спокойствіе шѣла и предъохраненіе груди отъ холоднаго воздуха, тепловатыми сухими припарками. 2) Когдажъ боль, въ сосцахъ бывающая, есть жестіюкая, постоянная, безпрерывно въ одномъ мѣстѣ безъ всякаго послабленія чувствуемая; тогда беременная должна не только препровождать свое время большею часію въ покоѣ, убігать всякаго шѣлодвиженія, не носить шѣснаго плашья и опіюдѣ не стягивать груди шѣсными шнуровками и повязками: но и при томъ употреблять пищу и питье самое легкое, шонкое, прохлаждающее, разводящее, и питающее



ище безъ опягожденія желудка: мясное кушанье, буде можно, вовсе оставишь: испражненію низомъ ежедневно пособлять промывашельными и легкими слабительными: полно-кровіе умалять кровопусканіемъ: часто къ больному мѣсту прикладывать припарки тепловатыя, пластыри разбивающіе, мази боль уполяющія: и еще сверхъ того защищать оное хлопчатною бумагою, и полошеницами теплыми, сухими, сахаромъ накуренными.

## II. Напряженіе сосцовъ.

123. Напряженіе сосцовъ причиняется тѣмъ, когда млечные сосуды и протоки отъ изобилія млека чрезмѣрно расширяются. Такое млека изобиліе рождается отъ полно-кровія, чрезъ прекращеніе мѣсячнаго кровото-ченія, ежедневно умножающагося.

124. Время, въ кое нѣйпаче напряженіе сосцовъ у беременныхъ женъ примѣчается, есть пятый, и послѣдніе беременности мѣсяцы. Тогда по большей частіи млечные сосуды наполняющіеся млекомъ споль изобиль-нымъ, чпо отъ легкаго прикосновенія и давланія, настоящее млеко изъ сосцовъ истекаетъ.



125. Врачеваніе сего припадка пребуеѣтъ особливаго вниманія: ибо хопя напряженіе сосцовъ, будучи не весьма чувствительнымъ, почти никакой боли, ни безпокойствія не причиняетъ беременной: но дабы млеко непрерывно, въ сосцахъ опдѣляемое, умножившись не створожилось, и не причинило опасныхъ слѣдствій, какъ то: великую опухоль, зашвердѣлость, вошженіе и прочая; въ разсужденіи сего надлежитъ заблаговременно спараться объ опвращеніи оныхъ исполненіемъ всего вышепоказаннаго (122.)

III. Затвердѣлая въ сосцахъ опухоль.

126. Затвердѣлая, или окрѣпая въ сосцахъ опухоль беременнымъ приключается отъ створожившагося и огустѣвшаго млека: отъ стѣсненія грудей тѣсными и узкими шнуровками и повязками: отъ удара внѣ причиненнаго: отъ лежанья навзничь; и отъ простуды.

127. Знаки, сей припадокъ изъявляющіе, суть сіи: не равномерная сосцовъ мягкость и округлость: опухоль швердая, крѣпкая, уступчивая, отъ сильнаго напряженія и расшяженія кровеносныхъ и млечныхъ сосудовъ рождающаяся: жестокая и несносная боль, без-



прерывно беременною въ сосцахъ ощущаемая, давленіемъ чувствительныхъ жилъ причиняемая.

128. Врачеванію сего припадка много способствующія разбивающія шепловапыя припарки, душистыя sprawy, кровопусканіе, легкія слабительныя лѣкарства, благоумѣренное вѣщій, къ питанію служащихъ, употребленіе, жизни образъ спокойный, отъ домашнихъ заботъ удаленный, и никакими душевными приспирасптіями не возмущаемый. При всемъ томъ, случается не рѣдко, что на стоящее зло не проходитъ, но еще отъ часа на часъ усиливается, и преждебывшая опухоль превращается въ вожденіе.

#### IV. Вожденіе сосцовъ!

129. Вожденіе, или воспаленіе въ сосцахъ раждается у беременныхъ отъ вышеобъявленныхъ причинъ (120. 123.): коего примѣтные знаки сѣи: жаръ во всемъ тѣлѣ чрезмѣрный: бѣненіе боевыхъ жилъ полное, твердое, скорое: боль въ сосцахъ отъ прикосновенія чувствительно умножающаяся: вожденное мѣсто рѣшетъ и краснѣетъ.

130. Средства къ отвращенію таковаго вожденія сѣи: кровопусканіе изъ руки въ скоромъ времени учиненное, а иногда и  
повшо-



повторенное: спокойное лежанье въ постели на спинѣ: легкія слабительныя по вседневно употребляемыя: тепловатыя пр. парки внѣ прикладываемыя: строгое порядочнаго образа жизни наблюденіе: и рачительное отъ холоднаго воздуха себя предохраненіе. Иногда вожженіе премѣняется въ нарывъ такъ, что не взирая на всѣ предпринимаемыя мѣры къ опивращенію онаго, употребляемыя средства и способы бывають тщетными и бездѣйственными.

#### У. Нарывъ въ сосцахъ.

131. Нарывъ въ сосцахъ приключившійся пребуесть великаго вниманія и попеченія. Знаки, коими онъ распознается, сунъ сїи: преждебывшая въ сосцахъ опухоль увеличивается, и отъ часа на часъ больше твердеетъ: боль поминутно усиливается: бїеніе чувствительное, и колебаніе гнойной матеріи въ нихъ ощущается. Все сїе означаетъ явственно, что нарывъ перемѣняется, или уже прешворился въ настоящее возгноеніе.

132. Возгноенію въ нарывѣ воспослѣдовавшему поспѣшествовать должно тепловатыми смягчительными припарками, прикладывая оныя до тѣхъ поръ, пока нарывъ созрѣетъ и откроется. Орудіемъ острымъ, разрѣзывать его не со-



вѣтуютъ ради двухъ причинъ: вопервыхъ дабы тѣмъ предохранить сосцы отъ рубцовъ, всегда послѣ нарочито учиненной раны оспающихъ: а во вторыхъ, дабы гной въ нарывѣ созрѣвши, скорѣе вонъ вытечь могъ. По открытіи нарыва не должно давливать сосцовъ, развѣ перстами, и то слегка дабы гной отпуда лучше истекалъ. Когда затвердѣлость тамо примѣчается, то ужно продолжая тѣмъ припарки, пока мѣсто окрѣпое совершенно размягчится. По очищеніи язвы отъ гноя, прикладывать къ ней щипанную пряжу, намазанную мазью воплощающею, подъ No. 31. означенную. По заживленіи же оной, употреблять часно промывательныя и слабительныя лѣкарства, наблюдая при томъ крайнее воздержаніе отъ всего того, что моглобы причинить жаръ въ тѣлѣ и въ крови волнованіе.

VI. Трѣщины на сосцахъ и поврежденіе сосочковъ.

133. Трѣщины или расщелины на сосцахъ, а найпаче на самихъ сосочкахъ у беременн-ныхъ женъ случаются отъ вышеобъявленныхъ припадковъ: отъ оспрошны крови: и отъ того, когда беременная будучи молода, еще недовольно искусилась опытомъ, часно и не-береж-



бережно сама ногтями царапаетъ груди, чувствуя тамо зудъ, и боль отъ напряженія сосцовъ раждающуюся.

134. Трещины на самыхъ сосочкахъ иногда случаются у дѣвицъ и опроковицъ передъ тѣмъ, когда онѣ еще въ первой разѣ получаютъ плотяное, и сосцы ихъ начинаютъ получать явственное приращеніе; ибо тогда чувствительное въ нихъ раздраженіе, власно какъ ползающими мурашками чинимое, тамо ощущается, такъ что онѣ неперпѣливости онѣ сами часто рукою болящую часть шрутъ, чешутъ, и не рѣдко острыми ногтями своими до крови расцарапываютъ, и тако повреждаютъ сосцы и сосочки, а иногда и совсѣмъ ихъ опрываютъ.

135. Сосочки грудные иногда едва примѣтными, а иногда такъ глубоко вписнутыми бываютъ въ самое существо сосцовъ, что почти ихъ и не видно. Причиною сего есть тѣсное платье, а особливо узкія цинуровки, коими у опроковицъ шуго стягиваютъ грудь, для збереженія мнимой спройности ихъ тѣла. Иногда тѣжъ сосочки грудные суть слѣпые, и никакого ошверстія въ себѣ неимѣютъ.



136. Врачеваніе прѣшииѣ, сосцы и сосочки обезображивающихъ, зависитъ отъ частаго употребленія внутреннихъ слабительныхъ, и отъ опіи прикладываемой воплощающей мази. Сосочки глубоко вписнуныя легкимъ и частымъ сосаніемъ успнымъ, или губами, либо посредствомъ курительнымъ трубокъ, стекляныхъ банокъ, восковыхъ трубочекъ, къ сосочкамъ прикладываемыхъ, отпуда наружу снова выпучиваются. Напоследокъ сосочки грудные совсѣмъ оторваны будучи единожды, супъ невозвратны и неизлѣчимы. Жена, такому случаю подверженная, отнюдѣ находится не въ состояніи кормить дѣтей своею грудью.

Беремѣнныя жены, желающія по окончаніи беременності воспытывать своими сосцами новорожденныхъ дѣтей, должны всячески пещися о томъ, дабы таковыя припадки заблаговременно отвращаются, и сосцы отъ нихъ защищаются и предъохраняемы были.

#### VI. Кашель.

137. Кашель есть припадокъ почти обыкновенный брюхатымъ женамъ, и большею частію въ послѣдніе мѣсяцы беременності при-



приключается. Въ прочемъ онъ ихъ больше беспокоитъ, чемъ опасенъ бываетъ.

138. Причины, кашель у беременнѣхъ производящія, суть сїи: 1) многокрое не-обыкновенное. 2) положеніе утробнаго младенца иногда споль высокое, чпо кажется власно какъ бы онъ досязалъ до самаго предсердія: сїе наипаче естъ сродно женамъ takimъ, кои суть малаго роста, и кои еще въ первой разъ очреватѣли (а). 3) осприя мокроты, опъ головы внизъ опускающіяся, насморкомъ, или простудою причиняемыя.

139. Врачеваніе кашля не всегда одинаковымъ образомъ предпріимается. напр. Когда кашель естъ не великъ, временно случающійся, не причиняя беременнымъ особливой досады; въ такомъ случаѣ довлѣютъ смягчительныя и боль утѣляющія лѣкарства, временно употребляемыя, подъ No. 33. означенныя. Когдажъ кашель естъ жестокъ, и безъ послабленія непрерывно про-

Е 4

дол-

---

(а) Врачъ Дела Момъ утверждаетъ, что щѣ только жены, у коихъ младенцы утробный высоко лежатъ, бывающъ подвержены тяжелой одышкѣ, стѣсненію грудей и рвошъ; и что кашель у нихъ случается только въ то время, когда къ тому еще присоединялся ближайшій онаго причины. Однакожъ противное сему ежедневные опыты доказываютъ.



должается: въ такомъ случаѣ великая опасность настоитъ, угрожающая беременной выкидываніемъ или недоношеніемъ; что дабы въ самомъ дѣлѣ съ нею не воспослѣдовало, надлежитъ ей имѣть наиприятнѣйшее о себѣ самой попеченіе; а именно: 1) всячески воздержаться отъ пищи прѣной, сольной, кислой и прудно сваривающейся; а употреблять тонкую, легкую, смягчительную, и не много питательную, и питье подобное: или вмѣсто питья довольствоваться подъ No. 5. прописаннымъ бульономъ; 2) часто наставлятъ промывательныя смягчительныя, и испражненію низомъ пособствующія, или подъ No. 1. означенное; 3) внутренно принимать оршадъ или другое молоко изъ смягчительныхъ, особливо маковыхъ сѣменъ прѣугощовленное, или подъ No. 23. означенное.

140. Когда кашель имѣетъ свое начало отъ многокровія, со рвотою сопряженнаго; въ такомъ случаѣ надлежитъ беременной пустить кровь изъ руки: по томъ спустя одинъ или два дни, дать ей легкое слабительное подъ No. 3. показанное, а при томъ наблюдать все выше (139) сказанное.

141. Когда кашель приключился отъ мокроты, или отъ проспуды; когда при томъ мо-  
кро-



кропы суть густыя, клейкія и вязкія: въ такомъ случаѣ сперва нужно беремъ нной пустить кровь; а потомъ часто употреблять сосисавъ лѣкарственный подѣ №. 26. означенный: и пить ячменную воду; въ прочемъ поступать по данному (139) наставленію, и всячески предѣохранять себя, отъ холоднаго воздуха, защищая все тѣло теплымъ одѣяніемъ, а наипаче голову, выю и грудь покрывами.

#### VII. Тяжелая одышка.

142. Тяжелая одышка у беременныя женъ случается на сносахъ; почти всегда съ кашлемъ сопряжена бываетъ: и отъ тѣхъ же причинъ (138) начало свое имѣетъ, а особливо отъ положенія младенца, высоко во утробѣ лежащаго.

143. Совершенное врачеваніе сему припадку приноситъ разрѣшеніе отъ бремени дѣторожденія. Однакожъ иногда можно хотя не совсѣмъ опивращать, по меньшей мѣрѣ нѣскольکو облегчать оной лѣкарствами, и прилѣжнымъ о себѣ попеченіемъ. Кровопусканіе изъ руки есть первое лѣкарство, особливо въ такомъ случаѣ, когда беременная есть полнокровна, и отъ природы тяжелой одышкѣ есть подвержена. Въ прочемъ должна она



употреблять питаніе умѣренное, тонкое и легкое: пособлять ежедневно испраженію низомъ легкими слабительными и промывательными, выше показанными: одѣваться такъ, чтобы платье нимало не беспокоило, не спѣсняло и не давило грудей: имѣть тѣлодвиженіе умѣренное: и внутренно принимать лѣкарство подѣ No. 34. предписанное,

### ГЛАВА ТРЕТІЯ НАДЕСЯТЬ.

О чревныхъ и нижнихъ удовѣ болѣзняхъ.

144. Беременнымъ, сверхъ вычисленныхъ по сіе мѣсто болѣзненныхъ припадковъ, часто случающихся и другія немочи, въ разныхъ тѣлесныхъ составахъ ощущаемыя. Таковыя суть нижеслѣдующія: боль въ животѣ, поясницѣ, пахахъ, бедрахъ и лядвѣяхъ: опухоль въ тѣхъ же, и во внѣшнихъ мягкихъ дѣтородныхъ женскихъ частяхъ: опіокъ ногъ: и напряженіе кровеносныхъ сосудовъ.

I. Боль въ животѣ.

145. Боль въ животѣ беременнымъ приключается наипаче отъ сихъ причинъ: 1) отъ раз-



разширенія и растяженія связокъ матки: 2) отъ давленія чувствственныхъ жилъ и кровеносныхъ сосудовъ, маткою разширенною имъ причиняемаго: и 3) отъ паденія, удара, скочка и прочая.

146. Таковая боль часто есть обыкновеннымъ, и почти неизбѣжнымъ слѣдствіемъ самой беременности. Иногда она сопротивляется и наилучшимъ вѣншимъ и внутреннимъ лѣкарствамъ. Чего ради, дабы она болѣе не усиливалася, а съ нею вмѣстѣ не умножались бы и прочіе болѣзненные припадки, всячески нужно пособлять беременной различными средствами, смотря по различію настоящаго ихъ состоянія и сложенія шѣла, какъ по: кровопусканіемъ, промывательными, слабительными легкими, усыпительными и боль утѣляющими, смягчительными припарками, мазьми, парами и прочая.

## II. Боль въ поясницѣ, пахахъ, бедрахъ и лядвяхъ.

147. Боль въ поясницѣ, пахахъ, бедрахъ и лядвяхъ у беременныхъ случается наипаче отъ сихъ причинъ: 1) отъ сильной напуги, отъ ношенія, и подниманія тяжелыхъ шѣлъ: 2) отъ паденія и пришибовъ: 3) отъ неумѣреннаго шѣлодвиженія и упражненія: 4) отъ дав-



давленія чувствительныхъ жилъ маткою и головою причиняемаго: 5 ) отъ каменной болѣзни, или нечислопы въ почкахъ, мочеточникахъ и мочевомъ пузырьѣ возродившейся.

148. Врачеваніе сего припадка исполняется отвращеніемъ причинъ, оной производящихъ. Напримѣръ: когда оная боль (147) раждается отъ троихъ первыхъ причинъ: тогда кровопусканіе изъ руки, спокойное опочиванье въ постели, пища и питье питательное и укрѣпляющее пользуютъ; при чемъ не бесполезно по вечерамъ принимать и усыпительное лѣкарство, подъ No. 12 или 13. означенное. Когдажъ оной боли причину есть давленіе матки: тогда еще сверхъ упомянутого наспавленія, надлежитъ подвязывать у беременной нижнюю ея чрева часть особливою повязкою (зри рис. 30. I.) Когдажъ оная боль имѣетъ свое начало отъ пятой причины: о чемъ можно удостовѣриться по таковымъ примѣчаніямъ: если у беременной моча истекаетъ въ маломъ количествѣ, съ пѣсочною осадкою, и съ кровью сопряженная: если ея родилиши были подвержены каменной болѣзни: если при томъ она часто спраждаетъ поточною и рвотою; въ такомъ случаѣ сверхъ вышепоказаннаго, часто наставлявши смягчительныя



ныя промывательныя, къ животу и поясницѣ прикладывать тепловатыя припарки, и часто смазывать; оныя мазью подѣ No. 20. означенною; а внутренно давать пепрушечной сокъ и похлебки съ симъ зельемъ приуготовленныя. Когдажъ оная боль, по исполненіи всего вышепоказаннаго не проходитъ и не уменьшается; тогда нужно и повторить кровопусканіе изъ руки, продолжая при томъ и употребленіе всѣхъ означенныхъ лѣкарствъ; а наймаче часто пить взваръ подѣ No. 35. предписанный. Напоследокъ когда боль, какъ во всѣхъ оныхъ частяхъ, такъ и въ самомъ животѣ безъ послабленія продолжается: когда при томъ изъ дѣтородныхъ частей вонъ истекаютъ мокроты съ кровью смѣшенныя, и не въ обыкновенное время приключаются; въ такомъ случаѣ, поелику настоитъ опасность, угрожающая выкидываніемъ, нужно поскорѣ въ помощь призвать искуснаго врача, или повивальную бабку.

### III. Опухоль чрева, паховъ, и дѣтородныхъ частей.

149. Опухоль чрева, паховъ и лядвѣй очреватѣвшимъ женамъ приключаются въ разныя, а особливо въ послѣднія времена беременності, при чемъ она бываетъ либо  
вре-



временно, либо непрерывно продолжающаяся. Иногда таковая опухоль у нихъ разпространяется по внѣшнимъ дѣйороднымъ частямъ, а иногда и по всему тѣлу.

150. Причины такой опухоли суть сѣи:

1) многокровіе, отъ сидячей жизни усиливающееся. 2) згущеніе и клейкость крови и соковъ. 3) не свободное кровообращеніе. 4) ослабленіе тѣлесныхъ частей. и 5) воспаленіе.

151. Припадки съ такою опухолью сопряженные, суть: пошнота, посклиивость, спѣшеніе груди, и рвота. Однакожъ не всегда и не всѣмъ случающимся, и дальней опасности не имѣютъ.

152. Врачеваніе таковой опухоли поспѣшествуется опдаленіемъ причинъ, оную производящихъ. напр. Когда опухоль есть великая, непрестанно днемъ и ночью продолжающаяся: то оная отвращается кровопусканіемъ: легкими слабительными: промывательными: пищею здоровою, легкою, тонкою, питательною, съ довольнымъ количествомъ поваренныхъ зелій приуготовленную: питіемъ подобнымъ, въпровъ и запора не раждающимъ: взваромъ подъ No. 35. прописаннымъ: воздержаніемъ отъ всего того, что горячитъ и производитъ въ крови волнованіе: частымъ ко  
вспу-



вспухшимъ частямъ прикладываніемъ тепловатыхъ припарокъ подъ No. 29. означенныхъ.

IV. О отокѣ ногѣ

153. Отокъ ногѣ въ тѣхъ времена, и отъ тѣхъ же причинъ приключается беременнымъ женамъ, отъ коихъ и припадокъ выше (149) объявленный; слѣдственно тѣмъ же и средствами врачуется. Когда у беременной отокъ ногѣ есть не великъ, и нижніе уды пухнутъ только тогда, когда она похаживаетъ, и имѣетъ тѣлодвиженіе, а проходитъ и минуетъ въ прочное время, сколь скоро она спокойно опочиваетъ въ постели; въ такомъ случаѣ покой для неѣ будетъ наилучшимъ лѣкарствомъ; а когда она захочетъ послѣ покоя посидѣть, то должна она имѣть свои ноги въ равномерномъ положеніи, подложенною подъ нихъ скамейкою поддерживаемая; поступая въ прочемъ по данному (152) наставленію.

V. Жилонепряженіе кровеносныхъ сосудовъ.

154. Жилонепряженіе кровеносныхъ сосудовъ часто случается беременнымъ на ногахъ, стегнахъ, а иногда и на вѣшнихъ мягкихъ дѣтородныхъ частяхъ женскихъ: и есть не что иное, какъ пухлина различной величины и ви-

да,



да, кровію наполненная, иногда безъ боли, а иногда со болью сопряженная.

155. Причины таковаго жилонапряженія суть сіи: разширеніе кровеносныхъ ножныхъ сосудовъ, отъ крови въ нихъ остановившейся: необыкновенное соустій боевыхъ и крововозвратныхъ жилъ зянїе и пропїяженіе: и давленіе матки, обратному кровообращенію препятствующей.

156. Врачеваніе сего припадка поспѣшествуется разными средствами: кровопусканіемъ, когда беременная есть многокровна: легкими слабительными и промывательными, частію употребляемыми: воздержаніемъ отъ пряной пици, разгорячительныхъ напитковъ, и отъ всего того, что причиняетъ жаръ въ тѣлѣ, и въ крови волнованіе: частымъ къ таковымъ жилонапряженіямъ прикладываніемъ внѣшнихъ лѣкарствъ, какъ то: крѣпителныхъ тепловатыхъ примочекъ, припарокъ, смягчительныхъ пласпирей, или мази боль утѣляющей, подъ No. 20. 21. 29. означенныхъ: обвертываніемъ ногъ, посредствомъ длинныхъ повязокъ изъ холста или изъ мягкой кожи здѣланныхъ, всегда при перевязкѣ наблюдая сіе, дабы оную начинать отъ самого нижняго больнаго мѣста, и продолжать въ верхъ даже до того, гдѣ она опуска-



опухоль совершенно кончипся; предѣохраненіемъ себя отъ излишней ходьбы и шѣлодвиженія: пребываніемъ въ постели; и наблюденіемъ того, чтобъ ноги долго внизъ не висѣли, но прямо протянуты лежали; при чемъ беременная должна крайне беречься того, дабы перстами, острыми ногтями вооруженными, не чесать, и не царапать, опасаясь того, чтобъ такое жилоннапряженіе не открылось, и не причинило бы опаснаго кровопеченія.

157. Трѣщина, рана, или язва въ такой жилоннапряженной пухлинѣ случайно ногтями, или другимъ образомъ причиненная, всегда для беременной есть опасною; поелику въ такомъ случаѣ всегда почти сильное кровопеченіе бываетъ, отъ котораго легко можетъ она припсти въ крайнюю слабость и изнеможеніе силъ тѣлесныхъ; въ разсужденіи сего надлежитъ всячески пещися о томъ, дабы скорѣе по правиламъ искусства таковую рану перевязать и заживитъ. Иногда, особливо при многокровіи, и кровопусканіе изъ руки не бесполезно.



## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ НАДЕСЯТЬ.

О теченіи лъживыхъ водѣ.

158. Лъживыя воды называются шѣ водяныя влаги, кои въ разныя времена у беременныхъ женъ изъ дѣпородныхъ ихъ часпей вонѣ истекають: иногда съ кровью или сукровицею смѣшанны бывають: и имѣють свое начало отъ различныхъ мѣспѣ, въ коихъ онѣ возраждаются.

159. Причины теченія лъживыхъ водѣ суть сїи: 1) иногда вода скопляется между внутреннею и вѣшнею зародовыми водяными оболочками: изъ коихъ послѣдняя, тяжесїію воды умножившейся, чрезмѣрно распянута бывши, на послѣдокъ прорывается. 2) иногда вода возраждается въ особливыхъ мѣшечкахъ, обрѣтающихся на поверхности вѣшней зародовой водяной оболочки, или между оною оболочкою и самою машкою, или въ водяныхъ пузыряхъ, внутри или внѣ рыльца машки нарождающихся. На послѣдокъ 3) иногда лъживое зачатїе, т. е. пустой пузырь водою наполненный въ самой машкѣ зародившись, отъ ежедневнаго въ немъ водѣ умноженія, чрезмѣрно разширенъ будучи, прорывается, и причиняетъ внезапное водѣ теченіе.



160. Знаки, по коимъ можно распознать льживыя воды онѣ наспоющихся водъ, кои обыкновенно предънаступающими родами выпекаютъ изъ самого того пузыря, въ коемъ младенецъ, будучи въ маткѣ, содержится, суть сѣи: 1) беременная не ощущаетъ никакой боли, при переимахъ бывающей, ни предъ испеченіемъ льживыхъ водъ, ни въ то время, когда онѣ текутъ, ниже по испеченіи оныхъ. 2) рыльце матки крѣпко сожато обрѣшается. 3) льживыя воды иногда мало по малу временно только, а иногда скоропоспѣжно, въ великомъ изобиліи, и съ нѣкоторымъ шумомъ вонъ испекаютъ. 4) чрево у беременной, по испеченіи таковыхъ водъ явственно умаляется. 5) наспоющія воды, во своемъ пузырьѣ содержимыя, во время приближающихся родовъ показывающіяся, и прорвавшись онпуда вонъ испекаютъ.

161. Качество испекающихъ льживыхъ водъ не всегда есть одинаковое. ш. е. иногда онѣ свѣтлы, иногда мутны, иногда желтоваты, иногда на сукровицу похожи, и съ кровію смѣшаны бывающъ.

162. Врачеваніе въ семъ случаѣ не имѣетъ мѣста; поелику такое льживыхъ водъ печеніе для беременной опаснымъ быть не можетъ.



Предъохраненіе себя отъ излишняго тѣлодвиженія, умѣренность въ пищѣ и питаньи; и спокойствіе тѣла и духа въ семъ случаѣ суть найаучшимъ для неѣ лѣкарствомъ.

## ГЛАВА ПЯТАЯНАДЕСЯТЬ.

*О прекращеніи переймовъ или родовой боли.*

163. Переймы или родовыя боли (Ч. I. ГЛ. XII.) предъ наступленіемъ родовъ бывающіе, иногда внезапно перестаютъ дѣйствовать, и со всѣмъ прекращаются.

164. Причины такового переймовъ прекращенія суть сїи: 1) преждевременное наступленіе водъ истеченіе. 2) неразуміе бабокъ, кои иногда прежде времени заспавляютъ беременныя долго похаживать, прудиться, и надуваться больше; чѣмъ сколько надобность того отъ нихъ требуетъ, а иногда и безразсудно прорываютъ оныя оболочки щипкомъ. 3) положеніе младенца во утробѣ неестественное, и 4) бездѣйствіе, или расслабленіе матки, и всего тѣла.

165. Бабичье пособіе въ семъ случаѣ есть необходимо нужнымъ. Когда прекращеніе перей-



реймовъ воспослѣдовало отъ 1 и 2 й причины (164); тогда надлежитъ немедленно беремѣнной пустить кровь изъ руки, и въ то самое время, какъ кровь изъ отверстой жилы течетъ, поддерживать еѣ такъ, чтобъ она стояла на ногахъ, пока у неѣ перевяжутъ руку: внутренно ей давать родогонительное подъ No. 13. означенное дѣкарспво: а вѣ къ животу прикладывать смягчительныя припарки, и часто наставлявать промывательныя. Когдажъ переймы прекратилися отъ послѣднихъ двоихъ причинъ, въ такомъ случаѣ, сколько можно, поскорѣе искусствомъ младенца вонъ вынять изъ утробы, и немедленно родящую отъ родовъ освободить надлежитъ.

КОНЕЦЪ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ.





## ОПЕЧАТКИ

ВЪ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ УЧИНЕННЫЯ.

Спран.	Спрок.	Напечатано.	Чишай.	
4	-	2	здораавый	здоровый
15	-	26	однокожѣ	однакожѣ
26	-	5	ин-легкое	легкое
28	-	11	нарывными	нарывными
61	-	22	ложала	лежала
63	-	26	сія жена	запоромѣ
89	-	9	гогова	голова



# ОГЛАВЛЕНІЕ.

103

ВЕЩАМЪ ВЪ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ СОДЕРЖАЩИМСЯ.

Главы.


Страниц.

	Вступленіе.	3
I.	О спраннымъ Вкусѣ, и побужденіи къ употребленію необыкновенныхъ веществъ.	17
II.	Объ отвращеніи отъ пищи.	21
	О тошнотѣ, и позывѣ на рвоту.	23
	О рвотѣ.	24
III.	О зубоболѣніи.	27
	О главоболѣніи.	28
	Объ омракахъ.	31
IV.	О многокровіи.	35
V.	О кровосеченіи.	39
VI.	О бѣли.	47
	О бѣлой грыжѣ.	49
VII.	О почечуѣ слѣпомъ.	51
	О почечуѣ открытомъ.	52
VIII.	О невареніи желудка.	54
	О мышѣ.	55
	О поносѣ кровавомъ.	57
IX.	О непрерывномъ печеніи мочи.	60
	О запорѣ урины.	62
X.	О низпаденіи матки.	68
	О выпаденіи задней кишки.	73
XI.	О судорогахъ.	74
XII.	О грудныхъ болѣзненныхъ припадкахъ.	78
	О боли и напряженіи сосцовъ.	80
	О зашвердѣлости сосцовъ.	81
	О вожженіи сосцовъ.	82
	О нарывѣ сосцовъ.	83
	О трѣщинахъ.	84
	О кашлѣ.	86
	О тяжелой одышкѣ.	89
XIII.	О разныхъ чревныхъ, и нижнихъ удовъ, немочахъ.	90
	О чревной боли.	91
	О Боли въ поясницѣ, пахахъ, бедрахъ и ладьяхъ.	91
	О опухоли чрева, паховъ и проч.	93
	О отіокѣ ногъ, и жилонапряженіи.	95
XIV.	О печеніи лживыхъ водъ.	98
XV.	О прекращеніи родовой боли.	100
















~~10~~  
~~25~~  
~~25~~

ms. 10134



